herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Żółw leśny

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis denticulatus to duży, ciemny żółw leśny z Amazonii i przyległych lasów, z żółtymi do pomarańczowych łuskami na głowie i kończynach. Pancerz ma zwykle 35-45 cm długości, a w niektórych populacjach zwierzęta osiągają 60-70 cm. Gatunek może żyć ponad 50 lat, przez cały rok wymaga równomiernego ciepła i wysokiej wilgotności powietrza, a zjada liście, owoce i niewielką ilość pokarmu zwierzęcego.

Rodzina: Testudinidae Nazwa angielska: Yellow-Footed Tortoise Dawna nazwa: *Chelonoidis denticulata; Geochelone denticulata; Testudo denticulata; Testudo tabulata*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**35-70 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**50-60 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Suchy las i las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**320 × 160 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**96-120 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2-7 jaj**
Inkubacja	**120-190 dni** przy 29-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Chelonoidis denticulatus utrzymuje się zasadniczo tak jak blisko spokrewnionego *Chelonoidis carbonarius*, ale jest to gatunek wyraźniej leśny, wymagający więcej cienia, stabilniejszego ciepła i równomiernie wysokiej wilgotności powietrza.

TEMPERATURA

Temperatura powietrza w dzień wynosi 26-29 °C, a miejsce do wygrzewania pod lampą grzewczą ma 29-32 °C, mierzone na samym podłożu. Chłodniejsza część ma 24-26 °C. W nocy temperatura może spaść do 20-23 °C, ale nigdy poniżej 18 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-90 %, co odpowiada wilgotnemu gatunkowi leśnemu. Podłoże musi być równomiernie wilgotne, ale nie może stać w nim woda.

OŚWIETLENIE I UVB

C. denticulatus jest aktywny w dzień, ale jest to lubiący cień gatunek leśny, który nie wygrzewa się w ostrym świetle jak gatunki pustynne.

ŻYWIENIE

C. denticulatus jest wszystkożerny. W naturze zjada liście, trawę, kwiaty, opadłe owoce, grzyby, padlinę i powolne drobne zwierzęta. Owoce stanowią nieco większą część diety niż u *C. carbonarius*, ale podstawą nadal są liście.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest spokojny i ciekawski, ale często nieco bardziej powściągliwy niż *C. carbonarius* i najchętniej przebywa blisko osłony. Wiele zwierząt staje się jednak ufnych i wychodzi, gdy pojawia się jedzenie.

NATURALNY ZASIĘG

Wenezuela, Gujana, Surinam, Gujana Francuska, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Peru, Boliwia i Trynidad i Tobago.