herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Żółw malowany

Chrysemys picta

Chrysemys picta to dzienny, półwodny żółw z Ameryki Północnej z czerwonymi i żółtymi paskami na szyi, kończynach i brzegu pancerza. Pancerz osiąga 13-25 cm, a zwierzę może żyć wiele dziesięcioleci. Dorosły osobnik wymaga dużego, filtrowanego zbiornika z kilkuset litrami wody, ciepłego miejsca do wygrzewania i silnego UVB.

Rodzina: Emydidae Nazwa angielska: Painted Turtle

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-25 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**300-500 g**
Długość życia	**25-40 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**130 × 65 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-40 °C**
Temperatura w nocy	**15-24 °C**
Wilgotność	**50-80%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 25-35 cm
Temperatura wody	**21-27 °C**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, gotowa karma, rośliny, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**4-15 jaj**
Zniesienia w roku	**1-5**
Inkubacja	**72-80 dni** przy 25-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Trzymaj zwierzę w akwarium, dużym zbiorniku lub zamkniętym stawie wewnątrz budynku, a nie w zwykłym terrarium.
TEMPERATURA	Powierzchnia miejsca do wygrzewania powinna mieć około 40 °C, mierzone termometrem na podczerwień kilka godzin po włączeniu lamp, a powietrze nad nim 30-35 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność dla żółwia zapewnia sama woda, więc względna wilgotność powietrza nie jest dla tego gatunku bliżej udokumentowana i nie ma decydującego znaczenia; 50-80 % w pomieszczeniu w zupełności wystarczy.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda jest miejscem życia zwierzęcia, więc musi być głęboka, czysta i ciepła. Woda musi być co najmniej dwa razy głębsza niż pancerz jest szeroki, a dla dorosłych osobników odpowiednie jest 25-35 cm.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest niezbędne. Gatunek należy do strefy Fergusona 3-4. Indeks UV na powierzchni miejsca do wygrzewania powinien wynosić około 3,0-4,0, a mile widziane są też strefy o niższym indeksie UV, by zwierzę mogło wybierać.
ŻYWIENIE	*C. picta* jest wszystkożerny. W naturze zjada rośliny wodne, glony, owady wodne, skorupiaki, ślimaki, małe ryby i padlinę.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*C. picta* jest aktywny w dzień, płochliwy i szybko ucieka do wody. Nie jest oswojony i źle znosi kontakt, więc należy go brać do rąk tylko wtedy, gdy to konieczne, np. przy kontroli zdrowia lub sprzątaniu.
NATURALNY ZASIĘG	Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.