herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana to średniej wielkości afrykański żółw lądowy o wydłużonym pancerzu i ruchomym zawiasie w tylnej części, który pozwala zamknąć pancerz nad tylnymi kończynami i ogonem. Pancerz ma 15-22 cm długości. Gatunek żyje na sawannie z wyraźną porą deszczową i porą suchą, wymaga stabilnego ciepła i pewnej wilgotności oraz łatwo się stresuje. Świeżo importowane zwierzęta często są silnie zarobaczone.

Rodzina: Testudinidae Dawna nazwa: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-22 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**30-50 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Sawanna**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**28-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-6 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**105-200 dni** przy 28-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Pewnej wiedzy o hodowli *Kinixys belliana* jest niewiele, ponieważ duża część starszych informacji pochodzi z czasów, gdy kilka gatunków traktowano jako jeden.

TEMPERATURA

Zwierzę trzeba trzymać w cieple. W dzień powinno być 28-32 °C, a w miejscu wygrzewania 32-35 °C, mierzone na podłożu. Temperatura nocna nie jest udokumentowana dla gatunku; 22-24 °C odpowiada klimatowi tropikalnemu.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Jako gatunek sawannowy *K. belliana* ma mniejsze wymagania co do wilgotności niż gatunki leśne *Kinixys homeana* i *Kinixys erosa*, ale lubi wilgoć i trzeba ją regularnie zraszać.

OŚWIETLENIE I UVB

K. belliana jest aktywna w dzień, ale najczęściej wychodzi wcześnie rano i późnym popołudniem, gdy światło jest słabe.

ŻYWIENIE

K. belliana jest wszystkożerna, a młode są niemal wyłącznie mięsożerne.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest płochliwy i po niepokojeniu chowa się w pancerzu lub zakopuje. Najbardziej aktywny jest wcześnie rano i późnym popołudniem.

NATURALNY ZASIĘG

Angola, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Kenia, Rwanda, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Uganda, Tanzania i Malawi.