herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Home's Hinge-back Tortoise

Kinixys homeana

Kinixys homeana is a small West African tortoise with a low, angular shell and a movable hinge at the rear, which can close the shell over the hind legs and tail. The shell is just over 20 cm long. The species lives in moist forest and swampy areas, is most active at dusk and stresses easily. It is critically endangered in the wild, and little reliable information exists on its care.

Rodzina: Testudinidae Dawna nazwa: *Cinixys homeana; Kinixys belliana homeana*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-22 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**30-50 lat**
Aktywność	**O zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**28-30 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**3-7 jaj**
Inkubacja	**110-115 dni** przy 28-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik I**
Załącznik unijny	**Załącznik A**
IUCN	**Krytycznie zagrożony (CR)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Little reliable information exists on the care of *Kinixys homeana*.
TEMPERATURA	By day the temperature should be 28-30 °C in most of the enclosure, and at night 22-24 °C. The night temperature is not documented for the species but suits a tropical lowland climate.
WILGOTNOŚĆ I WODA	As a forest species, *Kinixys homeana* needs more humidity than savanna species such as *Kinixys belliana*. Humidity should be 70-90 %, and newly imported or dehydrated animals need over 85 %.
OŚWIETLENIE I UVB	*K. homeana* is most active at dusk and stresses in bright light. Lighting should be subdued, with plants and hides where the animal can withdraw from the light.
ŻYWIENIE	*K. homeana* is omnivorous, and young animals are almost exclusively carnivorous. The diet is roughly half plant material and half animal food.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	The species is shy and withdraws into its shell or burrows when disturbed. It is most active early in the morning and late in the day and spends a lot of time buried in damp substrate.
NATURALNY ZASIĘG	Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gwinea Równikowa, Republika Środkowoafrykańska i Sudan Południowy.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/en/tortoises-and-turtles/kinixys-homeana