herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

## Speke's Hinge-back Tortoise

# *Kinixys spekii*

*Kinixys spekii* is a medium-sized, elongated tortoise from the savannas and open woodland of eastern and southern Africa. The shell is flat and usually 13-18 cm long, and a movable hinge at the rear lets adults close their hind legs inside. The species is a true omnivore with fungi as its favourite food; it stresses easily, and newly imported animals often carry many intestinal parasites, so it is not a tortoise for beginners.

Rodzina: Testudinidae  Dawna nazwa: *Cinixys spekii; Homopus darlingi; Kinixys australis; Kinixys jordani; Kinixys youngi*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **13-21 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Waga | **500-1 500 g** |
| Długość życia | **30-50 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Sawanna, suchy las i tereny skaliste** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **160 × 80 × 40 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **26-30 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **32-35 °C** |
| Temperatura w nocy | **20-24 °C** |
| Wilgotność | **50-70%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Niezbędne**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady, rośliny i dżdżownice i ślimaki** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **84-108 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **2-6 jaj** |
| Inkubacja | **220-365 dni**<br>przy 29 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Niepoddany ocenie (NE)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Little specific information exists on the care of *Kinixys spekii*, because the species was long treated as part of *Kinixys belliana* and is kept far less often than several of its relatives. |
| **TEMPERATURA** | During the day the enclosure should be 26-30 °C, with a basking spot of 32-35 °C under a lamp at one end, measured on the substrate. The basking spot temperature is borrowed from related tortoises. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | As a savanna species, *K. spekii* needs less humidity than the forest species of the genus, but it likes moisture and does not thrive in dry air. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *K. spekii* is diurnal, and its activity depends on the heat: on hot days the animal is out in the morning and evening and hides in the middle of the day, while on cool days it is out around midday. Natural sunlight is best. |
| **ŻYWIENIE** | *K. spekii* is a true omnivore. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | The species is shy and withdraws into its shell or digs in when disturbed. If picked up, it hisses, often empties its bowels and may snap at the air. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Angola, Botswana, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kenia, Malawi, Mozambik, Namibia, Rwanda, Republika Południowej Afryki, Eswatini, Tanzania, Uganda, Zambia i Zimbabwe. |