herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Mułowiec pensylwański

Kinosternon subrubrum

Kinosternon subrubrum to mały, ciemny żółw błotny z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Pancerz osiąga 8-12 cm, a gatunek przemieszcza się głównie po dnie płytkich, porośniętych roślinnością wód. Ma dwa ruchome zawiasy na plastronie, dzięki którym może zamknąć się niemal całkowicie, i może żyć 20-50 lat. Gatunek jest płochliwy, aktywny głównie o zmierzchu i potrzebuje filtrowanego zbiornika z płytką wodą, lampy grzewczej i UVB.

Rodzina: Kinosternidae Nazwa angielska: Eastern Mud Turtle Dawna nazwa: *Kinosternon pensylvanicum*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**8-12 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**90-260 g**
Długość życia	**20-50 lat**
Aktywność	**O zmierzchu**
Tryb życia	**Kopiący nory i półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-33 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 15-20 cm
Temperatura wody	**21-24 °C**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, gotowa karma, rośliny, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-96 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2-5 jaj**
Zniesienia w roku	**1-3**
Inkubacja	**75-125 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Kinosternon subrubrum* trzyma się w akwarium lub niskim zbiorniku z częścią lądową, a nie w zwykłym terrarium.
TEMPERATURA	Woda powinna mieć 21-24 °C, a grzałka z osłoną jest zwykle niezbędna. Miejsce do wygrzewania powinno mieć 30-33 °C mierzone na powierzchni, a powietrze w zbiorniku 24-29 °C w dzień. W nocy temperatura może spaść do 20-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza ma niewielkie znaczenie dla żółwia wodnego; 40-60 % w pomieszczeniu jest odpowiednie. Powietrze nad zbiornikiem nie może być zimne ani pełne przeciągów, bo zwiększa to ryzyko infekcji dróg oddechowych.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dla dorosłych osobników woda ma 15-20 cm głębokości, z płaskimi i płytszymi partiami, gdzie zwierzę może odpoczywać i sięgać szyją do powierzchni. Gatunek słabo pływa, więc głęboka woda wywołuje stres.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest zalecane, aby zwierzę mogło wytwarzać witaminę D3 i przyswajać wapń, a miejsce do wygrzewania powinno mieć zarówno lampę grzewczą, jak i świetlówkę UVB, mimo że gatunek wygrzewa się rzadko.
ŻYWIENIE	*Kinosternon subrubrum* jest wszystkożerny, ale przeważnie mięsożerny. W naturze zjada ślimaki, małże, dżdżownice, owady, pająki, skorupiaki, kijanki, padlinę, glony, rośliny wodne i nasiona.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Kinosternon subrubrum* jest płochliwy i aktywny, zwłaszcza o zmierzchu, i najczęściej widać go, gdy przeszukuje dno. Nie jest to zwierzę do brania na ręce: potrafi mocno ugryźć rogowym dziobem i wydzielić cuchnącą ciecz.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zolwie/kinosternon-subrubrum