herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus to średniej wielkości żółw z zachodniej i środkowej Afryki. Pancerz osiąga 18-28 cm, a gatunek może dożyć 30-50 lat. Jest odporny, aktywny i żarłoczny, wymaga dużego, filtrowanego zbiornika z ciepłą wodą, ciepłego miejsca do wygrzewania i UVB. Zwierzęta chowają głowę bokiem pod krawędź pancerza, a samce ostro gonią samice.

Rodzina: Pelomedusidae Dawna nazwa: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-28 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**30-50 lat**
Aktywność	**Za dnia i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Sawanna, las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**150 × 75 × 50 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-36 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**50-80%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 15-25 cm
Temperatura wody	**24-27 °C**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, gotowa karma, rośliny, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**11-27 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**53-75 dni** przy 27-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Trzymaj zwierzę w dużym akwarium lub zbiorniku, a nie w zwykłym terrarium.
TEMPERATURA	Woda powinna mieć 24-27 °C. Cieplejsza woda czyni zwierzę niespokojnym, a w chłodniejszej traci ono apetyt i szuka ciepła. Grzałka za plastikową osłoną jest zwykle konieczna, chyba że w pomieszczeniu jest wystarczająco ciepło.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza ma niewielkie znaczenie dla żółwia wodnego; 50-80 % w pomieszczeniu jest odpowiednie.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wodę trzeba utrzymywać w czystości, ponieważ gatunek nie zrzuca tarcz pancerza, więc brud zostaje na pancerzu. Głębokość wody wynosi 15-25 cm dla dorosłych, najlepiej ze stopniowo opadającym dnem, i około 10 cm dla młodych.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest niezbędne do syntezy witaminy D3 i przyswajania wapnia, a ponadto hamuje rozwój bakterii na pancerzu.
ŻYWIENIE	*Pelusios castaneus* jest wszystkożerny, ale wyraźnie skłania się ku pokarmowi mięsnemu. W naturze zjada skorupiaki, owady, ryby, krewetki, kraby i duże ślimaki oraz trochę roślinności, np. pistię i nasiona.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pelusios castaneus* jest spokojny, ciekawski i aktywny. Brane do ręki zwierzęta zwykle się chowają, rzadko gryzą, ale mogą drapać ostrymi pazurami, by się uwolnić.
NATURALNY ZASIĘG	Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gwinea Równikowa, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Angola, Republika Środkowoafrykańska i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zolwie/pelusios-castaneus