herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Florida Red-bellied Cooter

Pseudemys nelsoni

Pseudemys nelsoni to duży, aktywny w dzień żółw słodkowodny ze spokojnych jezior, stawów i bagien z gęstą roślinnością na Florydzie i na samym południowym wschodzie Georgii. Karapaks jest wysoki i ciemny z czerwonymi pasami, a plastron żółtopomarańczowy do czerwonawego. Samica może osiągnąć 38 cm długości karapaksu, a dorosłe zwierzęta są roślinożerne. Dorosły osobnik wymaga bardzo dużego, filtrowanego zbiornika, ciepłego miejsca do wygrzewania i silnego UVB.

Rodzina: Emydidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-38 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**20-33 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**200 × 100 × 70 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-31 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-40 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**50-80%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 30-45 cm
Temperatura wody	**21-31 °C**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, gotowa karma, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-96 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**7-26 jaj**
Zniesienia w roku	**3-6**
Inkubacja	**45-80 dni** przy 25-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Trzymaj zwierzę w dużym akwarium, zbiorniku lub zamkniętym stawie wewnątrz budynku, a nie w zwykłym terrarium.
TEMPERATURA	U *Pseudemys nelsoni* powierzchnia miejsca do wygrzewania powinna mieć około 40 °C, mierzone termometrem na podczerwień kilka godzin po włączeniu lamp, a powietrze nad nią 30-32 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Pseudemys nelsoni* żyje w wodzie, więc wilgotność powietrza nie ma decydującego znaczenia; 50-80 % w pomieszczeniu jest odpowiednie. Decydująca jest czystość wody.
WODA I JAKOŚĆ WODY	*Pseudemys nelsoni* żyje w wodzie, więc musi być ona głęboka, czysta i ciepła. Woda musi być co najmniej dwa razy głębsza niż pancerz jest szeroki, a dla dorosłych osobników odpowiednie jest 30-45 cm.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest niezbędne. *Pseudemys nelsoni* jest aktywna w dzień, dużo się wygrzewa i należy do strefy Fergusona 3.
ŻYWIENIE	*Pseudemys nelsoni* jest wyraźnie roślinożerna.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*P. nelsoni* jest aktywna w dzień i wygrzewa się w dużych grupach. Jest płochliwa i przy najmniejszym zakłóceniu zsuwa się z miejsca do wygrzewania do wody, ale przyzwyczaja się do stałych rutyn.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zolwie/pseudemys-nelsoni