herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Żółw lamparci

Stigmochelys pardalis

Stigmochelys pardalis to duży, spokojny i roślinożerny żółw lądowy z afrykańskich sawann, z czarno-żółtymi lamparcimi plamami na wysoko wysklepionym pancerzu. Zwykle dorasta do około 40 cm i może żyć 50-100 lat. Dlatego latem wymaga bardzo dużego wybiegu na zewnątrz, przez resztę roku ciepła i UVB w pomieszczeniu oraz bogatej w błonnik diety z traw i dzikich roślin.

Rodzina: Testudinidae Nazwa angielska: Leopard Tortoise Dawna nazwa: *Geochelone pardalis; Testudo pardalis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-45 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**13 000-20 000 g**
Długość życia	**50-100 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**320 × 160 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-40 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**40-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-30 jaj**
Zniesienia w roku	**1-7**
Inkubacja	**150-450 dni** przy 28-32 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosłe zwierzęta powinny mieć wybieg na zewnątrz, gdy pozwala na to pogoda, w chłodnym klimacie zwykle tylko w najcieplejszych miesiącach letnich (zob. Temperatura).

TEMPERATURA

W pomieszczeniu w dzień powinno być 24-32 °C, w miejscu wygrzewania 35-40 °C, a w nocy 20-24 °C. Wartości dla miejsca wygrzewania i nocy są częściowo zaczerpnięte od pokrewnego *Centrochelys sulcata*.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza nie jest udokumentowana dla tego gatunku; 40-70 % w pomieszczeniu dla zwierzęcia to szacunek. Gatunek pochodzi z sawann i terenów półsuchych i nie jest gatunkiem wilgociolubnym.

OŚWIETLENIE I UVB

UVB lub naturalne światło słoneczne jest niezbędne, bo bez niego zwierzę nie wytwarza witaminy D3 i nie może przyswajać ani wykorzystywać wapnia. Strefa Fergusona 3 to szacunek.

ŻYWIENIE

S. pardalis jest trawożerny i potrzebuje diety bogatej w błonnik i wapń. Podstawą jest wypas: mieszanka traw i ziół, którą można samemu uprawiać na wybiegu, np. lucerna i trawy.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

S. pardalis jest aktywny w dzień, płochliwy i spokojny. Gdy coś mu przeszkadza, chowa głowę i nogi, ale z czasem poznaje opiekuna i podchodzi po jedzenie. Należy go rzadko brać do rąk i nie jest to zwierzę dla małych dzieci.

NATURALNY ZASIĘG

Sudan Południowy, Etiopia, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Republika Południowej Afryki, Eswatini i Lesotho.