herpy

AGAMER

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster är en gråaktigt grön till brun skogsagam med en tagg bakom varje öga och en låg kam av taggar i nacken. Den är utbredd från södra Kina över Vietnam och Laos till Thailand och Myanmar. Arten blir 20-28 cm, lever i busksnår och på skogsbotten och behöver ett fuktigt, relativt svalt terrarium där luften inte blir varmare än 28 °C.

Familj: Agamidae Engelska: Brown Pricklenape Tidigare namn: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-28 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 50 × 100 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Värmeplats	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**6-12 ägg**
Inkubation	**110-130 dagar** vid 25-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 100 × 50 × 100 cm (längd × bredd × höjd). Arten använder både grenarna och botten, så golvytan är lika viktig som höjden. Ett par behöver mer utrymme.

TEMPERATUR

Acanthosaura lepidogaster tål värme dåligt. Luften i terrariet ska ligga på 20-26 °C på dagen och får inte bli varmare än 28 °C. Blir det varmare under längre tid finns risk för värmeslag, stress och uttorkning.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % på dagen och gärna runt 90 % på natten. Spraya terrariet ordentligt med mjukt vatten 2-3 gånger om dagen så att det hänger droppar på växter och väggar.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv, men lever i skuggan i skogen och behöver bara svag UVB. Använd ett T5 HO-rör på 6 % (Ferguson-zon 2) i en reflekterande armatur över nätet, som täcker ungefär halva terrariets längd.

UTFODRING

Arten lever av insekter och andra smådjur. Ge en varierad kost av syrsor, kackerlackor, gräshoppor, silkesmaskar, daggmaskar och små nakensniglar.

BETEENDE OCH HANTERING

Acanthosaura lepidogaster är en lugn skogsagam som ofta sitter helt stilla på en gren, en stam eller botten. Den rör sig sällan snabbt. När den blir skrämd blir den mörkare, breder ut nackkammen eller öppnar gapet.

NATURLIG UTBREDNING

Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam.