herpy

AGAMER

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae är en dagaktiv klippagam från savann och halvöken i Östafrika. Den dominerande hanen har mörkblå kropp och rött eller violett huvud, hals och axlar. Arten är snabb, klättrar bra och behöver ett rymligt, torrt terrarium med en mycket varm solplats och kraftig UVB.

Familj: Agamidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-23 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken, savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-35 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-7 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Agama mwanzae hålls och förökas i fångenskap, men skötseln är bara sparsamt beskriven. Uppgifterna om avel är lånade från den nära besläktade *Agama agama*.

TEMPERATUR

Agama mwanzae behöver en tydlig gradient. Solplatsen ska ha en yttemperatur på 40-45 °C, mätt med en infraröd termometer. Den varma delen av terrariet ska vara 30-35 °C och den svala änden omkring 28 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 20-40 %. Ställ alltid en låg, stabil skål med friskt vatten i terrariet och byt vattnet dagligen, eftersom arten dricker mycket.

LJUS OCH UVB

Agama mwanzae är dagaktiv och solar sig mycket, så den behöver kraftigt ljus och UVB motsvarande Ferguson-zon 3. Använd ett T5 HO-rör på 10-12 % i en reflekterande armatur över solplatsen och den varma halvan av terrariet.

UTFODRING

Agama mwanzae är insektsätare. Ge en varierad kost av välfödda insekter: kackerlackor och syrsor som huvudfoder och mjölmask och jättemjölmask i mindre mängder. Feta insekter som vaxmottslarver är bara till godbitar.

BETEENDE OCH HANTERING

Agama mwanzae är snabb, vaksam och revirhävdande. Två hanar får aldrig hållas tillsammans, eftersom de slåss och ger varandra allvarliga skador.

NATURLIG UTBREDNING

Tanzania, Kenya och Rwanda.