herpy

AGAMER

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella är en ljusgrön, mycket smal trädlevande agam från Sydostasiens skogar, där svansen utgör över tre fjärdedelar av längden. Den blir 50-58 cm, är dagaktiv och jagar insekter i träden. Den kan skifta från klart grönt till brunt när den blir orolig, och den är snabb, hoppskicklig och skygg.

Familj: Agamidae Engelska: Green Crested Lizard Tidigare namn: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**50-58 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2 ägg**
Inkubation	**47-80 dagar** vid 27-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Bronchocela cristatella*.
TEMPERATUR	Temperaturen följer klimatet i utbredningsområdet. Dagtemperaturen i terrariet ska ligga på 25-30 °C, och på en solplats högt upp på en gren ska det vara 32-38 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Den relativa luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %, som i en tropisk låglandsskog. Duscha terrariet ordentligt två gånger om dagen, så att blad och grenar är våta. Djuret dricker droppar från växterna, och en skål är inte nödvändig.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solar sig i skogsbryn och gläntor, så den ska ha kraftigt ljus och UVB. Använd ett T5 HO-rör på 6 % över solplatsen, motsvarande Ferguson-zon 2 med ett UV-index på 2-3 vid solplatsen och lägre i växtligheten.
UTFODRING	*Bronchocela cristatella* lever av insekter som den fångar i buskar och träd, bland annat fästingar.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg och blir lätt stressad. Under stress blir den brun, och den kan fly in i lövverket eller hoppa från grenarna. Den lämpar sig inte för hantering och är ett djur att titta på.
NATURLIG UTBREDNING	Malaysia, Singapore, Indonesien, Filippinerna, Thailand och Brunei.