herpy

AGAMER

Calotes versicolor

Calotes versicolor är en smal, snabb trädlevande agam från Sydasien som kan skifta färg från brunaktig till gul, röd och nästan svart, och hanen får under parningstiden ett skarpt rött huvud. Den blir 30-40 cm, är dagaktiv och lever mest av insekter. Den kräver ett högt terrarium med grenar, kraftig värme och UVB, och det får bara finnas en hane i varje terrarium.

Familj: Agamidae Engelska: Eastern Garden Lizard Tidigare namn: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**7-12 mån.**
Kullstorlek	**7-33 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**47-80 dagar** vid 27-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *C. versicolor* ska ha ett terrarium på minst 120 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd). Det är en trädlevande art, så höjden är lika viktig som golvytan. En hane med två eller tre honor ska ha minst 150 × 120 × 120 cm.

TEMPERATUR

Arten behöver en tydlig gradient. Dagtemperaturen i terrariet ska ligga på 24-29 °C, och på solplatsen ska det vara 35-40 °C. På natten ska det vara 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Den relativa luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig, så den behöver kraftigt ljus och UVB.

UTFODRING

C. versicolor är först och främst insektsätare. I naturen äter den myror, skalbaggar, trollsländor, gräshoppor och andra insekter, och den tar också små ryggradsdjur som andra ödlor, geckor och unga gnagare.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är nervös när den är ny, men vänjer sig vid lugna omgivningar. Den är snabb och kan smita ut när locket öppnas. Ge ett nytt djur ett par veckor i fred.

NATURLIG UTBREDNING

Indien, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodja, Vietnam, Malaysia, Indonesien och Kina.