herpy

AGAMER

Kragödla

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii är en stor, trädlevande agam från norra Australien och södra Nya Guinea. Den är känd för den stora hudkragen runt halsen, som den spärrar ut som ett hotfullt försvar. Den blir 60-90 cm, är dagaktiv och lever av insekter. Till gengäld kräver den ett mycket högt terrarium, kraftig värme och UVB, och den är skygg och lätt att stressa.

Familj: Agamidae Engelska: Frilled Lizard Tidigare namn: *Clamydosaurus kingii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-90 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**400-870 g**
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 75 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**23-27 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**4-20 ägg**
Kullar per år	**2-4**
Inkubation	**70-110 dagar** vid 28-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 150 × 75 × 150 cm (längd × bredd × höjd). Höjden är viktigare än golvytan, för arten är trädlevande, och hur högt djuret kan sitta ger trygghet.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ligga högst upp i terrariet och ha en yttemperatur på 38-42 °C, med omkring 40 °C som utgångspunkt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 60-70 %, och terrariet ska sprayas. Arten lever i ett klimat med kraftigt regn på sommaren och dricker vattendroppar. Ett regnsystem som körs ett par gånger om dagen passar bäst.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig, så den behöver ett kraftigt ljus över hela terrariet och en solplats med värme- och UVB-ljus. Sätt en lysrörs- eller LED-lampa på 6.500 K i terrariets längd utöver värmelamporna. UVB är nödvändigt.

UTFODRING

Chlamydosaurus kingii är insektsätare. Fodret består av syrsor, kackerlackor, fjärilslarver, silkesmaskar och enstaka superbagglarver. Termiter och myror är de viktigaste bytesdjuren i naturen.

BETEENDE OCH HANTERING

C. kingii är lugn och stillasittande i terrariet, men skygg för rörelser i rummet. Vissa djur tål att tas ut, men hantering stressar dem lätt, och djuret kan fräsa, spärra ut kragen och bita.

NATURLIG UTBREDNING

Australien, Papua Nya Guinea och Indonesien.