herpy

AGAMER

Ctenophorus pictus

Ctenophorus pictus är en liten, dagaktiv agam från Australiens torra inland, där hanen på våren lyser i rött, gult och blått. Den blir 18-25 cm, gräver ner sig i sand och lever av insekter. Arten är en livlig och snabb terrarieödla som kräver ett långt, sandigt terrarium, stark värme och UVB, men inte mycket höjd. Arten är mycket kortlivad, och det finns bara lite skötselkunskap om just den.

Familj: Agamidae Engelska: Painted Dragon Tidigare namn: *Amphibolurus pictus; Ctenophorus dudleyi* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-25 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**8-16 g**
Livslängd	**1-2 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2-4 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**55-80 dagar** vid 28-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par eller en liten grupp på upp till tre vuxna djur behöver ett terrarium på minst 100 × 40 × 40 cm (längd × bredd × höjd). Måttet är lånat från *Ctenophorus nuchalis*, som har samma levnadssätt.

TEMPERATUR
Arten är en ökenödla och behöver en stor temperaturskillnad.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska vara låg, omkring 20-40 %; siffran är en uppskattning utifrån livsmiljön. Terrariet ska ventileras väl och hållas torrt, och sanden får inte bli fuktig, med undantag för äggläggningshörnan.

LJUS OCH UVB
Dagaktiva ökenarter behöver starkt ljus och UVB. Ferguson-zonen är inte fastlagd för arten; *C. nuchalis* tillhör zon 3-4, och zon 3 är en bra utgångspunkt.

UTFODRING
Arten äter mest insekter, ofta myror och andra små leddjur i naturen, och enstaka djur tar också växtdelar. I terrariet är syrsor och kackerlackor huvudfodret, med mjölmask och silkesmaskar som omväxling.

BETEENDE OCH HANTERING
Djuret är snabbt, nervöst och drar sig snabbt undan om det blir skrämt. Hantering är inte nödvändig och stressar djuret. Hanen markerar sitt revir med huvudnickningar och armsvingar.

NATURLIG UTBREDNING
Australien.