herpy

AGAMER

Leiolepis belliana

Leiolepis belliana är en markbunden, dagaktiv agam från Sydostasien som gräver djupa hålor i sandig jord. Den har gula fläckar på ryggen och orange och svarta tvärband på sidorna, och den kan breda ut sidohuden som en fjäril. Arten blir 40-50 cm, mest svans, lever mest av insekter och kräver ett torrt terrarium med djupt, grävbart substrat, kraftig värme och UVB.

Familj: Agamidae Engelska: Common Butterfly Lizard Tidigare namn: *Leiolepis bellii; Uromastyx belliana* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-50 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Värmeplats	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-8 ägg**
Inkubation	**55-75 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 50 cm (längd × bredd × höjd). Golvytan är viktigast, eftersom arten är markbunden, men höjden ska rymma ett djupt substrat.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 35-37 °C. Följ djurets beteende och justera därefter. Luften i den varma änden är 30-35 °C, och den svala änden är 26-29 °C. På natten sjunker temperaturen till 20-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, och terrariet ska vara torrt. Sprayning är normalt inte nödvändig, utom i mycket torra miljöer. Djuret ska ha en skål med färskt vatten, så stor att det kan bada i den.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig på öppen mark, så den behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett lysrör eller en LED på 6.500 K över hela terrariet och ett T5 HO UVB-rör på 10-12 % över solplatsen.

UTFODRING

Leiolepis belliana äter mest insekter, men också växter. I naturen tas gräshoppor, skalbaggslarver, fjärilar och krabbor, och djuren äter också gräs och andra växter.

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är skyggt och snabbt och flyr ner i en håla när något rör sig. Det tål hantering dåligt. I naturen är djuren monogama och delar håla med en partner. Djuren kan hållas enskilt eller parvis.

NATURLIG UTBREDNING

Thailand, Myanmar (Burma), Kambodja, Vietnam, Malaysia och Indonesien.