herpy

AGAMER

Leiolepis reevesii

Leiolepis reevesii är en markbunden, dagaktiv agam från södra Kina och Sydostasien som gräver hålor i sandig jord och kan breda ut sidohuden som en fjäril. Ryggen har tätt sittande ljusa fläckar vars mörka kanter bildar ett grovmaskigt nät. Arten blir upp till omkring 50 cm, mest svans, går i dvala på vintern och kräver ett torrt terrarium med djupt, grävbart substrat, kraftig värme och UVB.

Familj: Agamidae Engelska: Reeves' Butterfly Lizard Tidigare namn: *Uromastyx reveesii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-50 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Värmeplats	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2-8 ägg**
Inkubation	**55-100 dagar** vid 27-33 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Leiolepis reevesii är en tillplattad, smal agam med rundat huvud, lång svans och små, kornformade ryggfjäll. Ryggen har många tätt sittande ljusa fläckar vars mörka kanter bildar ett grovmaskigt nät. På sidorna sitter orange- till tegelröda och svarta tvärband, som är mindre markanta än hos *Leiolepis belliana*. Det finns 13-16 lårporer på varje sida.

Kroppslängden från nos till kloak är upp till 15-17 cm, och enstaka uppgifter går upp till 19 cm. Svansen blir upp till 34 cm, så stora djur mäter omkring 50 cm totalt. Hanarna är större än honorna och har ett större huvud. Nykläckta ungar mäter knappt 4 cm från nos till kloak.

Arten beskrevs 1831 som *Uromastyx reveesii* och är uppkallad efter John Reeves, en engelsk naturforskare som bodde i Kina från 1812 till 1831. Släktet *Leiolepis* är taxonomiskt komplicerat. Gränsen mot *L. belliana* är inte helt skarp, och arten kan korsas med både *L. belliana* och *Leiolepis guttata*. Den rödbandade formen *rubritaeniata* räknades tidigare som underart till *L. reevesii* och förs nu som självständig art, *Leiolepis rubritaeniata*. *L. reevesii* förökar sig könsligt, men upprepade korsningar mellan den och *L. guttata* har gett upphov till släktets fyra rena honarter. Vid köp är det värt att försäkra sig om att djuret är rätt bestämt.

Utbredning och livsmiljö

Leiolepis reevesii lever i södra Kina (Guangdong, Guangxi, Hainan och Macao), Vietnam, Kambodja och Thailand. Typlokalen anges bara som Kina. Avgränsningen mot *Leiolepis belliana* och *Leiolepis rubritaeniata* gör den exakta utbredningen i Sydostasien osäker.

> **Naturlig utbredning:** Kina, Vietnam, Kambodja och Thailand.

LIVSMILJÖ

Arten lever i öppna, varma områden med sandig jord och gles vegetation, där den gräver hålor som den använder som gömställe, för övernattning och äggläggning. Djuren solar sig tätt vid hålans ingång och flyr ner i den vid ringa störning.

Hainan har bara två årstider, en regntid och en torrtid. Ändå går djuren i dvala från slutet av november till början av mars, och under den tiden ligger de i hålorna och äter inte. På sommaren präglas tarmfloran av bakterier som bryter ner växtfibrer, medan den på vintern är anpassad till den långa fastan.

Läs mer: Vintervila och årstider

Skötsel

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Leiolepis reevesii*. Terrarium, temperatur, fuktighet, ljus och livslängd bygger därför på *Leiolepis belliana*, den bäst kända arten i släktet, som lever under liknande förhållanden.

Ett par behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 50 cm (längd × bredd × höjd). Golvytan är viktigast, eftersom arten är markbunden, men höjden ska rymma ett djupt substrat. Ett enstaka djur kan klara sig med 90 × 45 × 45 cm.

Substratet ska vara minst 20 cm djupt och bestå av en blandning av sand och gödningsfri trädgårdsjord så att hålorna håller. Det nedersta lagret är svagt fuktigt, resten torrt. Lägg platta stenar, kork och rötter så att djuret har solplatser och gömslen, och fäst dem så att de inte kan underminera och välta. Ventilationen ska vara god, och locket ska gå att låsa, eftersom djuren är snabba och skygga.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 35-37 °C. Luften i den varma änden är 30-35 °C, och den svala änden är 26-29 °C. På natten sjunker temperaturen till 20-25 °C.

Djuret ska alltid kunna söka sig bort från värmen, ner i substratet eller in i ett gömställe. Använd halogenspotlights eller keramiska värmeelement med galler framför och en termostat. Mät med digitala termometrar och en infraröd termometer, och kontrollera solplatsen regelbundet. Ett djur som hela tiden söker skydd från värmen har det för varmt, och ett djur som inte solar sig har det för kallt.

I naturen går arten i dvala på vintern. Om en sval viloperiod är nödvändig eller gynnsam i terrariet är inte dokumenterat. Ett djur som på vintern drar sig in i hålan och slutar äta ska inte tvingas äta, men vägs regelbundet.

Läs mer: Värme och temperatur

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, och terrariet ska vara torrt. Det nedersta lagret av substratet hålls svagt fuktigt så att hålorna inte rasar, men ytan får inte vara våt, eftersom det ger mögel. Djuret ska ha en skål med färskt vatten, som fylls dagligen.

Läs mer: Luftfuktighet, sprayning och ventilation

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig på öppen mark, så den behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett lysrör eller en LED på 6.500 K över hela terrariet och ett T5 HO UVB-rör på 10-12 % över solplatsen. Ferguson-zonen är inte fastställd för släktet; zon 3 passar för en ödla som solar sig på öppen mark. Kontrollera avståndet med en UV-mätare, och byt rören enligt tillverkarens anvisning. Ljuset ska vara tänt 10-12 timmar om dagen.

Läs mer: Ljus och UVB

UTFODRING

Leiolepis reevesii är allätare och äter både insekter och växter, och växtfödan är en viktig del av kosten. Ge syrsor, kackerlackor, gräshoppor och mjölmaskar, och erbjud varje dag mörkgröna blad som maskros, kålblad och senapsgrönt samt blommor. Frukt ges bara lite. Sallat har nästan inget näringsvärde och undviks.

Ungar och vuxna matas varje dag med det djuret äter på omkring 10 minuter. Pudra insekterna med kalk vid varje utfodring och med ett multivitamin med D3 en gång i veckan. Variera fodret.

Läs mer: Foderdjur: hållning och avel Läs mer: Kalk, vitaminer och tillskott

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är skyggt och snabbt och flyr ner i en håla när något rör sig. Det tål hantering dåligt och passar bäst för en hållare som vill iaktta ett djur som gräver och solar sig.

Djuren kan hållas enskilt eller parvis. Två hanar får inte sättas ihop, eftersom de slåss. Ge gott om solplatser och gömslen, och sätt nya djur i karantän.

Läs mer: Karantän och hygien

Avel

KÖNSMOGNAD OCH KÖNSBESTÄMNING

Hanarna är större än honorna och har ett större huvud, både absolut och i förhållande till kroppen. Båda könen har lårporer. Honorna är könsmogna från en kroppslängd på omkring 9 cm från nos till kloak; åldern vid könsmognad är inte dokumenterad. En hona ska vara fullvuxen och i god hull före parning, eftersom äggläggningen tar på hennes kalk och krafter.

PARNING

Arten förökar sig könsligt. I naturen kommer djuren fram ur vinterdvalan i början av mars, och äggen läggs från april till juli. Hur parningen går till i terrariet, och om en sval viloperiod främjar aveln, är inte dokumenterat. Håll paret tillsammans så länge det går fredligt.

ÄGGLÄGGNING OCH KULLAR

Honan lägger 2-8 ägg per kull, i genomsnitt 3-4, i en håla. I naturen lägger hon en kull per år mellan april och juli; i fångenskap kan hon lägga flera kullar under samma säsong. Antalet ägg beror inte på honans storlek, och små honor lägger relativt tyngre kullar än stora. Ge honan möjlighet att gräva en håla i djupt, svagt fuktigt substrat i terrariets varma ände. En hona utan lämplig plats kan hålla inne äggen, och det är livsfarligt.

INKUBATION

Äggen kläcks efter omkring 70 dagar vid 30 °C, efter 55 dagar vid 33 °C och först efter omkring 100 dagar vid 27 °C. Flest ägg kläcks vid 30 °C, och ungar från 27 °C springer sämre än ungar från varmare ägg. I naturliga bon ligger temperaturen mest på 28-32 °C, så 30 °C är det bästa valet. Temperaturen bestämmer inte könet. Gräv försiktigt upp äggen utan att vända dem, och lägg dem i fuktad vermikulit i en sluten box i en kläckmaskin med termostat.

UPPFÖDNING AV UNGAR

Ungarna mäter knappt 4 cm från nos till kloak när de kläcks. De behöver ett eget terrarium med djupt substrat och många gömslen. Mata dem dagligen med små insekter och fint skuren grönsak, pudra med kalk och ge UVB. Ungar växer snabbt, och för lite kalk och UVB ger benskörhet.

Hälsa och vanliga misstag

De flesta problem beror på fel i uppställningen. Håll särskilt utkik efter:

- Benskörhet (metabolisk skelettsjukdom) när UVB eller kalk saknas. Mjuka käkar, darrande ben och sneda lemmar är tecken; ge kraftig UVB och kalk på insekterna.
- Viktnedgång under vintervilan. Det är normalt att djuret fastar på vintern, men väg det varannan vecka, och avbryt vilan om det går märkbart ner i vikt.
- Äggläggningsproblem hos honor utan djupt, fuktigt grävsubstrat. En hona med synliga ägg som inte lägger dem ska till

veterinär.

- Parasiter och mag-tarmproblem hos nyinköpta djur. Låt undersöka ett träckprov under karantänen.
- Tarmstopp om djuret sväljer stora mängder lös sand. Ett substrat med jord som får hålorna att hålla minskar risken.
- Mögel och hudproblem vid för vått substrat.

Kontakta en veterinär om djuret är slött, slutar äta utanför vintervilan eller har svårt att ömsa hud.

Fråga alltid dina kunniga bekanta

Guiden är ett bra ställe att börja på, men den kan inte ersätta erfarenhet. Djur är olika, och mycket av det viktigaste lär man sig av dem som har hållit arten i åratal. Prata med en uppfödare, en erfaren djurhållare eller en veterinär med kunskap om kräldjur och groddjur innan du skaffar djuret - och igen om något verkar fel.