herpy

AGAMER

Leiolepis rubritaeniata

Leiolepis rubritaeniata är en markbunden, dagaktiv agam från Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam som gräver hålor i sandig jord och kan breda ut sidohuden som en fjäril. Den sköts som den nära besläktade *Leiolepis belliana*: ett torrt terrarium med djupt, grävbart substrat, kraftig värme och UVB. Det finns bara lite kunskap om just den här arten, så de flesta siffrorna är lånade.

Familj: Agamidae Engelska: Reeves' Butterfly Lizard Tidigare namn: *Leiolepis belliana rubritaeniata; Leiolepis reevesii rubritaeniata*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Värmeplats	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-8 ägg**
Inkubation	**55-75 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Leiolepis rubritaeniata*. Siffrorna i guiden är lånade från *Leiolepis belliana*, som har samma levnadssätt och lever i samma sorts landskap.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 35-37 °C. Luften i den varma änden är 30-35 °C, och den svala änden är 26-29 °C. På natten sjunker temperaturen till 20-25 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, och terrariet ska vara torrt. Sprayning är normalt inte nödvändig. Djuret ska ha en skål med färskt vatten, så stor att det kan bada i den, och skålen fylls dagligen.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solar sig på öppen mark, så den behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett lysrör eller en LED på 6.500 K över hela terrariet och ett T5 HO UVB-rör på 10-12 % över solplatsen.
UTFODRING	Släktet *Leiolepis* är allätare, och *L. rubritaeniata* äter både insekter och växter; fördelningen är inte känd för arten.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuret är skyggt och snabbt och flyr ner i en håla när något rör sig. Det tål hantering dåligt. Hos släktet delar en hane och en hona ofta håla. Djuren kan hållas enskilt eller parvis.
NATURLIG UTBREDNING	Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam.