herpy

AGAMER

Kinesisk vattenagam

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus är en stor, grön och semiakvatisk agam från skogsklädda vattendrag i Sydostasien. Den blir upp till cirka 90 cm, varav över två tredjedelar är svans. Arten är dagaktiv, klättrar och dyker och kräver ett mycket stort, högt och fuktigt terrarium med en djup vattendel, kraftig UVB och en varm solplats. En stor del av djuren i handeln är vildfångade.

Familj: Agamidae Engelska: Chinese Water Dragon Tidigare namn: *Dilophyrus mentager* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**70-90 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**250-600 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 90 × 180 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 15-30 cm
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, växter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-18 ägg**
Inkubation	**60-75 dagar** vid 29-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett enskilt vuxet djur behöver ett terrarium på minst 180 × 90 × 180 cm (längd × bredd × höjd). Arten är stor och aktiv, klättrar och simmar, och i ett mindre terrarium blir den stressad och skadar sig.
TEMPERATUR	Solplatsen ska vara 35-40 °C, mätt med en digital termometer på själva grenen. Uppgifterna varierar från cirka 32 till cirka 50 °C, och ungar klarar sig bäst i den låga änden. Luften i den svala änden ska vara 25-28 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 60-80 %, högst på morgonen (cirka 75-80 %) och lägre på kvällen (cirka 50-60 %). Det klaras med 1-2 dagliga duschningar eller ett automatiskt regnsystem, ett fuktigt substrat och en stor vattendel.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen ska vara så stor att djuret kan dyka och simma: minst 15 cm djup, gärna mer, och den ska täcka en tredjedel till hälften av botten. Arten kan ligga länge under vatten och sover ibland i vattnet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver stark UVB motsvarande Ferguson-zon 3. Använd ett T5 HO-rör på 10-12 % UVB i en reflekterande armatur på samma sida som värmelamporna.
UTFODRING	*Physignathus cocincinus* är allätare men lever mest av insekter. Unga djur äter nästan bara insekter, och med åldern tillkommer fler växter. Ungar under 3 månader: små syrsor varje dag.
BETEENDE OCH HANTERING	*Physignathus cocincinus* är skygg och stresskänslig, särskilt vildfångade djur. Låt ett nytt djur vänja sig utan hantering, och börja därefter ge mat med pincett, så att djuret kommer fram till dig.
NATURLIG UTBREDNING	Kina, Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand.