herpy

AGAMER

Pogona barbata

Pogona barbata är en av de största skäggagamerna: en kraftig, dagaktiv agam på 50-65 cm från Australiens östra skogar och buskmarker, med ett välutvecklat, mörkt skägg och gul munhåla. Den är mer territoriell än *Pogona vitticeps*, klättrar gärna och kräver ett stort terrarium, kraftig värme och UVB.

Familj: Agamidae Engelska: Eastern Bearded Dragon Tidigare namn: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**50-65 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-37 °C**
Värmeplats	**42-45 °C**
Temperatur, natt	**12-24 °C**
Luftfuktighet	**30-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**15-35 ägg**
Kullar per år	**2-3**
Inkubation	**55-75 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Skötseln av *P. barbata* är bara sparsamt beskriven för själva arten.
TEMPERATUR	Värm med minst två halogenspotlights över solplatsen. Ytan där ska vara 42-45 °C mätt med en infraröd termometer, och den varma fläcken ska vara minst lika stor som hela djuret inklusive svansen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska i genomsnitt ligga på 30-60 %, mätt i den svala änden. Den varierar naturligt: lägre vid solplatsen, högre på natten och vid vattnet.
LJUS OCH UVB	*Pogona barbata* är beroende av kraftigt, vitt ljus, som främjar aptit och aktivitet. Terrariet ska vara mycket ljust, och solplatsen ska vara det ljusaste stället.
UTFODRING	*P. barbata* är allätare. I naturen består födan av insekter, maskar, små ryggradsdjur och växtdelar. Unga djur får mest insekter och vuxna mest växter.
BETEENDE OCH HANTERING	*Pogona barbata* är territoriell och visar det tydligare än *Pogona vitticeps*. Ett svart, utspänt skägg, öppen mun med den gula munhålan, fräsande och ett litet hopp mot motståndaren är hot.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.