herpy

AGAMER

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni är den minsta skäggagamen: en låg, kompakt agam på högst cirka 30 cm från de trädlösa slätterna med svart lerjord i centrala Queensland, med ett svagt skägg och ett kort, trubbigt huvud. Den är dagaktiv, lugn och nöjer sig med mycket mindre plats än *Pogona vitticeps*, men har samma behov av värme, kraftig UVB och ett grävbart bottensubstrat och blir 10-15 år gammal.

Familj: Agamidae Engelska: Black-soil Bearded Dragon Tidigare namn: *Pogona brevis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**5-19 ägg**
Kullar per år	**2**
Inkubation	**58-64 dagar** vid 29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enskilt vuxet djur behöver ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm, och mer plats används. En liten grupp, till exempel en hane med en eller flera honor, kräver minst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 38-45 °C, mätt med en infraröd termometer på stenen. Den svala änden ska vara 24-29 °C. Använd en halogenspotlight över en platt sten eller en bit trä; halogen efterliknar solens värme bäst.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska i genomsnitt ligga på 30-50 %, mätt mitt i terrariet med en digital hygrometer. Korta svängningar uppåt eller nedåt är ofarliga.

LJUS OCH UVB

P. henrylawsoni är dagaktiv och ska ha mycket, klart vitt ljus och kraftig UVB.

UTFODRING

P. henrylawsoni är allätare och äter mest insekter och bladgrönt. Nykläckta (under 3 månader): insekter 2-3 gånger dagligen och grönsaker dagligen. Unga (3-7 månader): insekter två gånger dagligen och grönsaker dagligen.

BETEENDE OCH HANTERING

P. henrylawsoni är lugn och tål försiktig hantering, men tycker inte om att hållas fast eller vändas på rygg och sprattlar om det sker.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/agamer/pogona-henrylawsoni