herpy

AGAMER

Pogona minor

Pogona minor är en medelstor, förhållandevis smal och dagaktiv skäggagam på 30-40 cm från sydvästra och centrala Australien, med bara ett svagt skägg av små taggar. Den lever i dyner, snår och torra skogar, äter mest insekter och lägger flera små äggkullar per år.

Familj: Agamidae Engelska: Western Bearded Dragon Tidigare namn: *Amphibolurus minor; Pogona loriae* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-19 ägg**
Kullar per år	**2-4**
Inkubation	**58-64 dagar** vid 29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *P. minor* är bara sparsamt beskriven. Siffrorna för terrarium, temperatur, fukt, ljus, foder och livslängd är lånade från *Pogona vitticeps* och den mindre *Pogona henrylawsoni*.

TEMPERATUR

Värm med minst två halogenspotlights över solplatsen. Ytan där ska vara 40-45 °C mätt med en infraröd termometer, och den varma fläcken ska vara minst lika stor som hela djuret.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, mätt i den svala änden, och terrariet ska kunna torka upp, för arten lever i torra trakter.

LJUS OCH UVB

Pogona minor är beroende av kraftigt, vitt ljus, som främjar aptit och aktivitet. Solplatsen ska vara det ljusaste stället, och 75-100 % av terrariets längd bör vara belyst.

UTFODRING

Pogona minor är mest insektsätare. I naturen utgör insekter och andra smådjur omkring 80 % av födan och växtdelar omkring en femtedel. Nykläckta (under 3 månader): insekter 2-3 gånger dagligen och grönsaker dagligen.

BETEENDE OCH HANTERING

Pogona minor är dagaktiv och solar sig mycket. Djuret använder kroppsspråk som andra skäggagamer: hanarna nickar med huvudet mot rivaler, och vinkning med ett framben är ett tecken på underkastelse.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/agamer/pogona-minor