herpy

AGAMER

Nullabor Bearded Dragon

Pogona nullarbor

Pogona nullarbor är en medelstor skäggagam på cirka 30-35 cm med kort nos och kort svans, som bara är känd från Nullarborslätten i södra Australien. Den är rödbrun till orangebrun med ljusa tvärband och flera rader stora taggar längs sidorna, och den hålls mycket sällan i terrarium.

Familj: Agamidae Tidigare namn: *Amphibolurus nullarbor*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-35 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-12 mån.**
Kullstorlek	**14-20 ägg**
Inkubation	**75-85 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Pogona nullarbor*, eftersom arten nästan inte hålls utanför Australien.
TEMPERATUR	Värm med minst två halogenspotlights över solplatsen. Ytan där ska vara 40-45 °C mätt med en infraröd termometer, och den varma fläcken ska vara minst lika stor som hela djuret.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, mätt i den svala änden, och terrariet ska kunna torka upp, eftersom arten lever i ett torrt område.
LJUS OCH UVB	*Pogona nullarbor* är beroende av kraftigt, vitt ljus, som främjar aptit och aktivitet. Solplatsen ska vara den ljusaste platsen, och 75-100 % av terrariets längd bör vara upplyst.
UTFODRING	*Pogona nullarbor* matas som andra medelstora skäggagamer: mest insekter och ett dagligt tillskott av grönt. Födovalet i naturen är inte dokumenterat för arten.
BETEENDE OCH HANTERING	*Pogona nullarbor* är dagaktiv och solar sig mycket. Beteendet är inte undersökt för arten; släktets övriga arter nickar med huvudet åt rivaler och vinkar med en framfot som tecken på underkastelse, och detsamma kan förväntas här.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.