herpy

AGAMER

Saara hardwickii

Saara hardwickii är en kraftig, växtätande dabbödla från Thar-öknen och de omgivande torra slätterna i Indien och Pakistan. Den blir 34-49 cm, gräver djupa hålor i fast jord och lever i lösa kolonier. Den kräver ett stort, varmt och torrt terrarium med djupt bottensubstrat och kraftig UVB. Arten förekommer sällan i handeln, och skötseln bygger till stor del på erfarenheter från släktet *Uromastyx*.

Familj: Agamidae Engelska: Hardwick's Spiny-tailed Lizard Tidigare namn: *Uromastyx hardwickii; Uromastyx hardwicki; Uromastyx griseus; Uromastyx reticulatus; Centrocercus similis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**34-49 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 70 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**16-22 °C** 8-12 veckor
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**8-15 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 33-34 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 150 × 70 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Välj ett terrarium i trä, PVC eller plast med glasfront och gärna nätlock.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 45-50 °C, mätt med en infraröd termometer precis under lampan.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara låg, 20-30 %, mätt vid botten på den svala sidan. Ihållande hög luftfuktighet gör djuret sjukt, så spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus, skilt från värmen.
UTFODRING	*Saara hardwickii* är nästan ren växtätare, och i naturen är gräs den viktigaste födan.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten lever ensam i sin håla och ska hållas enskilt. Ett nytt djur ska få vara ifred de första veckorna och kan ta lång tid på sig att börja äta, särskilt om det är vildfångat.
NATURLIG UTBREDNING	Indien, Pakistan och Afghanistan.