herpy

AGAMER

Uromastyx acanthinura

Uromastyx acanthinura är en kraftig taggsvansödla från de steniga och grusiga delarna av norra Sahara. Den blir 30-43 cm och väger omkring 450 g, gräver djupa hålor och lever mest av växter. Den kräver ett stort, varmt och torrt terrarium med djup botten och kraftig UVB, och den kan leva i mer än 20 år. Arten är territoriell och hålls ensam.

Familj: Agamidae Engelska: North-African Mastigure Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-43 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-24 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken, halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**16-22 °C** 8-12 veckor
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**48 mån.**
Kullstorlek	**6-23 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**56-84 dagar** vid 33-34 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre, till exempel 150 × 60 × 60 cm för ett stort djur. Vanliga glasterrarier är för små.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 50-55 °C, mätt med en infraröd termometer strax under lampan. Den svala sidan ska vara 27-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten i terrariet ska vara låg: omkring 20-30 %, mätt vid botten på den svala sidan. Ihållande hög luftfuktighet gör djuret sjukt, så spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och kräver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus utöver värmelampan.
UTFODRING	Vuxna djur är nästan rena växtätare.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är utpräglat territoriell: båda könen försvarar sitt område, och i strider biter djuren varandra i sidorna, så att det kan uppstå vita ärr. Även kullsyskon angriper varandra om de hålls tillsammans för länge.
NATURLIG UTBREDNING	Algeriet, Tunisien och Libyen.