herpy

AGAMER

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar är en taggsvansödla från Sahara och Sahel med fyra underarter, bland andra den stora *U. d. flavifasciata* och den ofta hållna *U. d. maliensis* från Mali. Arten blir 28-50 cm beroende på form, är växtätare och gräver ned sig i en djup botten. Den kräver ett stort, varmt och torrt terrarium med kraftig UVB och är mer ett djur att titta på än att hantera.

Familj: Agamidae Engelska: Sudan Mastigure Tidigare namn: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**28-50 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**200-400 g**
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**29-35 °C**
Värmeplats	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**18-21 °C** 8-12 veckor
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36 mån.**
Kullstorlek	**10-20 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**60-80 dagar** vid 33 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur av nominatformen eller *U. d. maliensis* ska ha ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Den större *U. d. flavifasciata* ska ha minst 150 × 60 × 60 cm.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 45-50 °C, mätt med en infraröd termometer strax under lampan. Mitten av terrariet ligger på 35-38 °C och den svala änden på 29-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara under 30 %. Arten tål något högre luftfuktighet, så länge terrariet är torrt och varmt nog, men den tål inte att vara kall och fuktig. Spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus utöver värmelampan.
UTFODRING	*Uromastyx dispar* är växtätare.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur är territoriella, särskilt hanar mot hanar, och två hanar får aldrig hållas tillsammans.
NATURLIG UTBREDNING	Algeriet, Västsahara, Mali, Mauretanien, Sudan och Tchad.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/agamer/uromastyx-dispar