herpy

AGAMER

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata är en liten, kompakt dabbödla från klippöknarna runt södra delen av Röda havet. Ryggen är prydd med ljusa ögonfläckar, och hanen är mer färgstark än honan. Arten blir 25-30 cm, lever av växter och gräver ner sig i ett djupt, torrt bottensubstrat. Den kräver ett varmt, torrt terrarium med kraftig UVB och förväxlas lätt med sina närmaste släktingar.

Familj: Agamidae Engelska: Ocellated Spinytail Tidigare namn: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken, halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-60 mån.**
Kullstorlek	**4-20 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 33-34 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 50-55 °C, mätt med en infraröd termometer strax under lampan. Den svala sidan ligger på 27-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara låg, omkring 20-30 %, mätt vid botten på den svala sidan. Ihållande hög luftfuktighet gör djuret sjukt, så spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus, skilt från värmen; djuren är då mer aktiva och äter bättre.
UTFODRING	*Uromastyx ocellata* är växtätare. Omkring 90 % av födan ska vara bladgrönt och blommor, ca 5 % hårda grönsaker och ca 5 % torrfoder.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur är lugna och stationära, men revirhävdande mot artfränder, särskilt hanar mot hanar. Håll dem enskilt.
NATURLIG UTBREDNING	Egypten, Sudan, Eritrea, Djibouti, Etiopien och Somalia.