herpy

GRODOR

Ceratophrys cranwelli

Ceratophrys cranwelli är en bred, nattaktiv bakhållsjägare från Gran Chaco i Sydamerika. Den ligger nergrävd med bara ögon och mun framme och snappar åt sig allt som ryms i munnen. Arten blir 8-13 cm, ska bo ensam och är robust nog att vara en bra första groda, om du kan leva med att den inte går att ta upp och biter hårt.

Familj: Ceratophryidae Engelska: Chacoan Horned Frog Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-13 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**117-202 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Vintervila	**16-20 °C** 6-12 veckor
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Ägg per läggning	**900-2 000**
Kläckning	**2-4 dagar** vid 24-26 °C
Larvtid	**21-41 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur ska ha ett liggande terrarium på minst 45 × 45 × 30 cm. Tumregeln är en golvyta på 8-10 gånger djurets storlek, och höjden betyder mindre, för *Ceratophrys cranwelli* sitter på marken och klättrar inte.

TEMPERATUR

På dagen hålls terrariet på 24-28 °C och på natten på 22-24 °C. Unga grodor äter dåligt om det är mycket under 25 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten hålls på 50-70 %, lägre än för de flesta andra sydamerikanska grodor, eftersom Gran Chaco är ett torrt område. *C. cranwelli* tål att fuktigheten sjunker under dagen, så länge botten är fuktig.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge alltid friskt vatten i en låg, tung skål som grodan inte kan välta när den gräver och som är tillräckligt stor för att hela djuret ska kunna ligga i den.

LJUS OCH UVB

UVB är inte nödvändigt för *Ceratophrys cranwelli*, men grodan får lite UV i naturen, och ett svagt UVB-rör (Ferguson-zon 1) kan vara en fördel. Ge i så fall gott om skugga med bredbladiga växter och möjlighet att gräva ner sig.

UTFODRING

Ceratophrys cranwelli äter nästan allt som rör sig och kan komma in i munnen. I naturen äter den bland annat andra grodor.

BETEENDE OCH HANTERING

Ceratophrys cranwelli är en lugn, stillasittande groda som kan ligga på samma plats i veckor. Den är nattaktiv och vilar med öppna ögon.

NATURLIG UTBREDNING

Argentina, Bolivia, Paraguay och Brasilien.