herpy

GRODOR

# *Ceratophrys ornata*

*Ceratophrys ornata* är en kraftig, bredmunnad groda från Pampas i Argentina, Uruguay och längst i söder i Brasilien, som ligger nergrävd och väntar på att något ätbart ska komma förbi. Honorna blir upp till 17 cm och kan svälja byten som är nästan lika stora som de själva. Arten är robust och lätt att sköta, men kräver respekt för munnen och fasta rutiner för rengöring och utfodring.

Familj: Ceratophryidae  Engelska: Ornate Horned Frog  Publicerad 15 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **8-17 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Vikt | **187-482 g** |
| Livslängd | **6-15 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Marklevande och grävande** |
| Biotop | **Våtmark och tempererad skog och äng** |
| Hudgift | **Inget känt** |
| Svårighetsgrad | **Nybörjare** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 30 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **24-28 °C** |
| Temperatur, natt | **22-24 °C** |
| Luftfuktighet | **65-80 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Vintervila | **16-20 °C**<br>6-12 veckor |
| Föda | **Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodyngel i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **12-24 mån.** |
| Ägg per läggning | **1 000-2 000** |
| Kläckning | **2-4 dagar**<br>vid 24-26 °C |
| Larvtid | **28-41 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Andra grodyngel** |
| Yngelvård | **Ingen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**
Ett vuxet djur ska ha ett liggande terrarium på minst 45 × 45 × 30 cm. Tumregeln för släktet är en golvyta på 8-10 gånger djurets storlek, och en stor hona får gärna mer.

**TEMPERATUR**
På dagen hålls terrariet på 24-28 °C och på natten på 22-24 °C. *C. ornata* äter bäst i den varma änden och sämre när det är svalt. Över 30 °C eller under 18 °C under längre tid kan vara dödligt.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**
Luftfuktigheten hålls på 65-80 % hela året och höjs till omkring 90 % under parningstiden. Spruta lätt varje dag så att botten är fuktig men inte blöt.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**
Ge alltid en låg skål med friskt, behandlat vatten, tillräckligt stor för att hela grodan ska kunna ligga i den, och med vattnet högst upp till grodans mun.

**LJUS OCH UVB**
UVB är inte nödvändigt, men ett svagt UVB-rör (Ferguson-zon 1) kan vara till nytta, eftersom grodan i naturen får lite UV.

**UTFODRING**
Arten äter nästan allt som kan komma in i munnen. I naturen äter vuxna grodor framför allt ryggradsdjur som möss, små fåglar, ödlor och andra grodor, men också stora spindlar och insekter.

**BETEENDE OCH HANTERING**
*Ceratophrys ornata* är en stillasittande groda som ligger nergrävd större delen av tiden och bara kommer fram för att äta. Den är inget djur att ta upp. Den kan hoppa efter en hand som kommer för nära, och bettet gör ont.

**NATURLIG UTBREDNING**
Argentina, Uruguay och Brasilien.