herpy

GRODOR

Mantella madagascariensis

Mantella madagascariensis är en liten, dagaktiv groda från regnskogarna i östra centrala Madagaskar: svart med rödorange, svartfläckiga bakben, ljusgröna fläckar vid frambenen och en himmelsblå, hästskoformad teckning på strupen. Den blir bara 21-25 mm, lever av myror och andra små leddjur och kräver ett svalt, fuktigt terrarium. Arten är sårbar i naturen, så välj helst uppfödda djur.

Familj: Mantellidae Engelska: Madagascan Mantella Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**21-25 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-23 °C**
Temperatur, natt	**16-18 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**12-30**
Kläckning	**3-12 dagar**
Larvtid	**56-112 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett lågt, flackt terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd) rymmer en grupp på fyra vuxna djur. Grodan lever på marken, så bottenytan är viktigare än höjden.

TEMPERATUR

Mantella madagascariensis trivs svalt. På dagen ska det vara 20-23 °C, och på natten får temperaturen sjunka till 16-18 °C. Korta perioder upp mot 24 °C kan klaras, men längre tid med värme ger sjukdom och kan döda djuren.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara hög större delen av tiden, 70-100 %, särskilt när det är varmt. Spruta terrariet med avklorerat vatten varje dag, kraftigt i varmt väder och något mindre när det är kallt.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ställ in en låg vattenskål i terrariet och låt den alltid vara fylld. Grodorna är dåliga simmare, så skålen ska vara så låg att de lätt kan ta sig upp, och den får inte ta upp mycket av botten.

LJUS OCH UVB

Något UVB-behov är inte dokumenterat hos arten, och grodorna klarar sig utan. Ett svagt UVB-ljus (Ferguson-zon 1) kan användas som valfritt tillägg, om det finns skugga och växter, så att djuren kan välja.

UTFODRING

Grodan är en ivrig jägare och kan äta förhållandevis stora bytesdjur i förhållande till sin storlek. I naturen lever den mest av myror och kvalster.

BETEENDE OCH HANTERING

Mantella madagascariensis är dagaktiv och kan ses patrullera i sitt område och jaga mat större delen av dagen. Hanarna kväker från lövlagret för att försvara området och locka honor, och de kan brottas med varandra.

NATURLIG UTBREDNING

Madagaskar.