herpy

GRODOR

Mantella viridis

Mantella viridis är en liten, dagaktiv groda på 2-3 cm med skarpt grön färg, svart ansiktsmask och blåvitt marmorerad buk. Den lever bara längst i norr på Madagaskar, tål värme dåligt och är hotad i naturen, så bara uppfödda djur bör komma i fråga.

Familj: Mantellidae Engelska: Green Mantella Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**2-3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**40-115**
Larvtid	**42-56 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Inredningen kan vara enkel. Golvyta betyder mer än höjd, eftersom *M. viridis* nästan bara lever på marken.
TEMPERATUR	På dagen hålls terrariet på 20-24 °C med en sänkning till 17-20 °C på natten. Över 27 °C stressas *M. viridis* snabbt, och i släktet kan temperaturer över 27 °C snabbt bli dödliga, särskilt för unga djur.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten hålls på 60-70 % till vardags och upp till 80 % under lektiden, med mer fukt nere vid botten och i mossan. Arten tål ett ganska brett spann, så länge det alltid står rent vatten framme.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Det ska alltid finnas en låg vattenskål eller en låg vattenyta, så att grodorna inte torkar ut vid lägre luftfuktighet. Vattnet ska vara så lågt att små djur lätt tar sig upp, och djupet är inte dokumenterat.
LJUS OCH UVB	Ljuset är först och främst till för växterna. Det finns ingen dokumentation för att *M. viridis* behöver UVB, men eftersom arten är aktiv i delvis sol i naturen är ett svagt UVB-rör sannolikt en fördel.
UTFODRING	*M. viridis* är en liten insektsätare som tar små bytesdjur.
BETEENDE OCH HANTERING	*M. viridis* är dagaktiv och trivs bäst i grupp. Utanför lektiden är djuren så gott som passiva mot varandra, men vuxna honor kan slåss under lektiden. Ett stort terrarium med många synbarriärer dämpar det.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/froeer/mantella-viridis