herpy

GRODOR

Phlyctimantis maculatus

Phlyctimantis maculatus är en slank, nattaktiv groda från Östafrika och nordöstra Sydafrika med gråbrun, mörkfläckig rygg och knallröda fält på insidan av bakbenen. Den går och springer hellre än hoppar, klättrar i grenar på natten och gräver ner sig på dagen. Arten är härdig och kan hållas i par eller små grupper, men grodynglen behöver ovanligt lång tid på sig för att bli till grodor.

Familj: Hyperoliidae Engelska: Red-legged Kassina Tidigare namn: *Kassina maculata; Hylambates maculatus* Publicerad 15 november 2026

Mild hudgift

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 60 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 5 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**300**
Läggningar per år	**2-3**
Kläckning	**3-5 dagar** vid 24 °C
Larvtid	**150-300 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Uppgifterna för ett par eller en trio varierar från 60 × 45 × 60 cm till 60 × 75 × 60 cm, och ett terrarium med stor bottenyta är att föredra: *Phlyctimantis maculatus* lever mest på marken, men klättrar gärna upp till omkring 50 cm.
TEMPERATUR	På dagen hålls terrariet på 22-27 °C med en varm ände omkring 26 °C och en svalare ände omkring 20-22 °C, och på natten 20-23 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ligger på dagen på 60-70 % och får gärna stiga till 70-80 % på natten. Spraya varje kväll med ljummet vatten, gärna med ett tidsstyrt spraysystem, så att fuktigheten stiger när ljuset släcks.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Terrariet ska ha en vattendel som täcker ungefär en fjärdedel av bottnen, med omkring 5 cm vatten och låga kanter eller en gren, så att grodorna lätt tar sig upp igen.
LJUS OCH UVB	Om UVB är nödvändigt råder det inte enighet om, men det rekommenderas, eftersom D3 i pulverform ensamt inte är en säker lösning.
UTFODRING	*P. maculatus* äter insekter och i naturen även mindre grodor. I terrariet används syrsor, gräshoppor, flugor, malar och kalkmaskar, och foderdjuren får högst vara lika stora som avståndet mellan grodans ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	*P. maculatus* är skygg och ligger större delen av dagen gömd eller nedgrävd. På natten blir den aktiv, klättrar och går på jakt. Hanarna ropar med ett högt, kort kvack som upprepas med mellanrum.
NATURLIG UTBREDNING	Kenya, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Sydafrika och Eswatini.