herpy

GRODOR

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax är en smal, nattaktiv trädgroda på 4-9 cm från Sydostasien, som lägger äggen i ett skumbo vid vattnet. Den är anpassningsbar, lever gärna nära människor och är lätt att hålla, men tål inte värme över 29 °C. Förökningen sätts igång i en regnkammare.

Familj: Rhacophoridae Engelska: Four-lined Tree Frog Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-9 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog, regnskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**100-400**
Kläckning	**3-4 dagar**
Larvtid	**49-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Två vuxna *P. leucomystax* kan hållas i ett glasterrarium på 45 × 45 × 60 cm, som räcker till 2-4 djur. Ett mindre terrarium på 60 × 30 × 40 cm kan rymma tre djur, men arten hoppar långt och har nytta av mer utrymme.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 23-27 °C på dagen och 18-22 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Håll luftfuktigheten på 60-70 %. Det klaras med handspruta, dimanläggning eller regnanläggning, flera gånger om dagen efter behov.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*P. leucomystax* ska alltid ha tillgång till rent vatten i en stor, låg skål som är lätt att göra ren och som grodan lätt kan ta sig upp ur.
LJUS OCH UVB	Arten behöver inget annat ljus än det som växterna kräver. Det finns ingen dokumentation för att den behöver UVB, men en svag UVB-källa kan användas för växterna och verkar dessutom bakteriehämmande.
UTFODRING	*P. leucomystax* är insektsätare, och syrsor kan vara basfoder, kompletterat flera gånger i månaden med vaxmottslarver, silkesmaskar, nattfjärilar, flugor, små daggmaskar och små kackerlackor.
BETEENDE OCH HANTERING	*P. leucomystax* är nattaktiv och sitter på dagen gömd bland växter och grenar, men nappar gärna åt sig ett foderdjur som kommer förbi. Den hoppar långt och klättrar bra, men glidflyger inte som en del av släktingarna i familjen.
NATURLIG UTBREDNING	Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand.