herpy

GRODOR

Ranoidea caerulea

Ranoidea caerulea är en stor, lugn och knubbig trädgroda på 7-12 cm från norra och östra Australien och södra Nya Guinea. Den är härdig, kan leva i mer än 20 år och räknas som en av de enklaste grodorna att hålla. Det största problemet i fångenskap är att den äter allt den kan gapa över och lätt blir för fet.

Familj: Pelodryadidae Engelska: Australian Green Treefrog Tidigare namn: *Litoria caerulea; Pelodryas caerulea* Publicerad 15 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-12 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**7-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattendel** djup 2-10 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24 mån.**
Ägg per läggning	**150-2 000**
Läggningar per år	**3-4**
Kläckning	**1-3 dagar**
Larvtid	**30-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *R. caerulea* kan hållas i ett terrarium på 45 × 45 × 60 cm. En grupp på 3-4 djur kan hållas i ca 60 × 40 × 60 cm, och upp till fyra vuxna behöver minst 50 × 25 cm bottenyta.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 19-22 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Överduscha terrariet en gång om dagen så att luftfuktigheten hålls på 80-95 %. Mer sparsam sprutning, bara var 3:e-4:e dag, kan också fungera när vattendelen håller fuktigheten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*R. caerulea* ska alltid ha tillgång till vatten. En fast vattendel på 8-10 cm med lätt tillgång upp är bra, men en stor, låg vattenskål som är lätt att ta ut och rengöra går också att använda.
LJUS OCH UVB	Grodan behöver inte annat ljus än det som växterna kräver. Lysrör är att föredra framför glödlampor, eftersom de avger mindre värme, och överhettning och uttorkning stressar grodorna.
UTFODRING	Vuxna *R. caerulea* äter syrsor, vandringsgräshoppor, spyflugor och dubiakackerlackor och tar också daggmaskar. Vaxmalslarver, mjölmaskar och andra larver är godbitar i små mängder.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. caerulea* är lugn och inte skygg och sitter ofta synligt framme. Den hoppar inte mycket, utan väntar på att ett byte ska komma förbi och hoppar sedan de sista 10-15 cm.
NATURLIG UTBREDNING	Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea.