herpy

GRODOR

Rhacophorus reinwardtii

Rhacophorus reinwardtii är en stor, nattaktiv flygfrog från Javas skogar. Den är jadegrön med svart simhud mellan fingrar och tår, som den använder för att glida från träd till träd. Honorna blir upp till 8 cm, hanarna omkring 6 cm. Arten kräver ett högt, luftigt terrarium och svala temperaturer, och om förökning i fångenskap vet man lite.

Familj: Rhacophoridae Engelska: Reinwardt's Flying Frog Tidigare namn: *Hyla reinwardtii* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**130-180**
Kläckning	**5 dagar**
Larvtid	**85 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Terrariet ska vara högt och luftigt. För 3-4 uppfödda vuxna är minimimåttet omkring 45 × 45 × 60 cm, och större är bättre för en groda som glider.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-24 °C på dagen, motsvarande vanlig rumstemperatur, och låt det gärna sjunka till 18-21 °C på natten. Arten tål korta perioder upp till 27-28 °C, men är en bergsart som föredrar det svalt.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %. Terrariedjur klarar sig vid 60-80 %, medan luftfuktigheten i naturen är 82-100 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ in en stabil, låg vattenskål i terrariet, som grodan kan sitta i på natten. 2-3 cm vatten räcker, så att grodan lätt kommer upp igen. Byt vattnet så snart det är smutsigt, och helst varje dag eller varannan dag.
LJUS OCH UVB	Grodan är trädlevande, och en svag UVB-källa av den typ som används för tropiska skogsdjur rekommenderas. Det är inte undersökt om arten behöver den, så ge alltid skuggiga platser som grodan kan dra sig tillbaka till.
UTFODRING	*Rhacophorus reinwardtii* äter levande insekter.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är nattaktiv och skygg och tillbringar dagen gömd mellan bladen; större delen av tiden sitter den på glaset eller på inredningen.
NATURLIG UTBREDNING	Indonesien.