herpy

GRODOR

Theloderma corticale

Theloderma corticale är en nattaktiv, halvt vattenlevande groda från skogarna i norra Vietnam, Laos och södra Kina. Den knöliga, grön- och svartfläckiga huden liknar mossa och lav så bra att grodan nästan försvinner i terrariet. Den vill ha det svalt och blött och tål inte värme, men är i gengäld lätt att få att leka.

Familj: Rhacophoridae Engelska: Tonkin Bug-eyed Frog Tidigare namn: *Rhacophorus corticalis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-9 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog, bergsskog och klippterräng**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-23 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 5-10 cm
Vattentemperatur	**17-22 °C**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Vintervila	**13-16 °C** 4-22 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**8-10 mån.**
Ägg per läggning	**6-47**
Kläckning	**9-22 dagar**
Larvtid	**75-180 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Theloderma corticale* ska ha ett akvaterrarium där en stor del av botten, eller hela botten, står under vatten.
TEMPERATUR	Värme är artens största fiende. Bäst är 16-23 °C, och ner till ungefär 10 °C går bra, medan allt över 25 °C är en varningssignal, och temperaturer över 27 °C kan döda grodorna.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara hög: över 80 % och aldrig under 60 %, annars kan grodorna torka ut. Honorna lägger ägg vid 80-90 %. Den stora vattenytan håller fukten uppe av sig själv, så grodorna behöver inte duschas särskilt ofta.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen är artens hem. Vattnet ska vara 5-10 cm djupt, och djupare vatten fungerar också. Grodorna ska kunna sitta i vattnet och lätt komma upp på kork eller rötter.
LJUS OCH UVB	Grodan är nattaktiv och har inget dokumenterat behov av UVB. Ett svagt UVB-rör för skuggarter (Ferguson-zon 1) kan användas och ger det lilla UV-index som kan stödja dygnsrytmen, men det är valfritt.
UTFODRING	*T. corticale* äter insekter: syrsor med god mage, dubia-kackerlackor, vaxmott-larver, soldatflugelarver och små tobakshökslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	*Theloderma corticale* är lugn och gömmer sig på dagen i rör, grottor och bland växter. Några minuter efter att ljuset har släckts blir den aktiv. Den bör inte hanteras, för huden är känslig, och grodan har inget att vinna på det.
NATURLIG UTBREDNING	Vietnam, Laos och Kina.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/froeer/theloderma-corticale