herpy

GRODOR

Trachycephalus resinifictrix

Trachycephalus resinifictrix är en stor, kraftig och nattaktiv trädgroda från Amazonas trädkronor. Ungdjuren är svart- och vitrandiga, de vuxna marmorerade, och när den hotas avger grodan ett mjölkvitt hudsekret. Den leker i vattenfyllda trädhål, är robust att hålla och liknar i mycket *Ranoidea caerulea*.

Familj: Hylidae Engelska: Amazon Milk Frog Tidigare namn: *Phrynohyas resinifictrix* Publicerad 15 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**100-1 500**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**21-75 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet par kan hållas i ett akvarium på ungefär 75 liter, och ett terrarium på 75 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd) räcker för två till fyra vuxna, även om mer utrymme alltid är bättre.
TEMPERATUR	*Trachycephalus resinifictrix* tål ett brett temperaturspann.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten är mindre kritisk än temperaturen, men terrariet ska duschas minst en gång om dagen. Använd avklorerat kranvatten eller osmosvatten, som inte heller ger kalkfläckar på glaset.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*Trachycephalus resinifictrix* ska ha en stor skål med rent vatten, som motsvarar trädhålet i naturen. Skålen ska vara så stor att grodan kan sitta i den, och den används nästan varje natt, så snåla inte med storleken.
LJUS OCH UVB	*Trachycephalus resinifictrix* är nattaktiv och kan både leva och fortplanta sig utan UVB, men ungdjur som växer upp med UVB blir större och får ett friskare skelett än ungdjur utan. Därför rekommenderas ett svagt UVB-ljus.
UTFODRING	*T. resinifictrix* är glupsk och sällan kräsen. Syrsor kan utgöra största delen av kosten, och de ska vara ungefär så långa som grodans huvud är brett.
BETEENDE OCH HANTERING	*T. resinifictrix* är inget djur att hantera. Huden är genomsläpplig och känslig för olja och salter från människohud, och hudsekretet kan irritera.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien, Franska Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru och Ecuador.