herpy

GECKOR

Sarasin's giant gecko

Correlophus sarasinorum

Correlophus sarasinorum är en stor, sällsynt och nattaktiv gecko från de fuktiga skogarna längst i söder på Nya Kaledonien. Den liknar en kraftig version av släktingen *Correlophus ciliatus*, men har större ögon, ofta en ljus V-teckning i nacken och en mycket mer begränsad utbredning. Arten är sårbar i naturen och sällsynt i terrarier.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Rhacodactylus sarasinorum*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-28 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite dokumenterad praxis för *Correlophus sarasinorum*, så siffrorna bygger på erfarenheterna med den mindre *C. ciliatus*.

TEMPERATUR
Correlophus sarasinorum behöver 22-26 °C på dagen, och ett litet område högst upp får gärna nå 26-28 °C. På natten ska temperaturen sjunka till 18-21 °C. Håll alltid ett öga på värmen.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten hos *Correlophus sarasinorum* bör variera som i skogen, där nätterna är fuktiga och dagarna torkar upp.

LJUS OCH UVB
Correlophus sarasinorum är aktiv i skymningen och på natten och sover i trädhål på dagen. Det är inte dokumenterat hur mycket UVB den behöver.

UTFODRING
Det finns ingen publicerad utfodringspraxis för *Correlophus sarasinorum*. Den är allätare och äter insekter och frukt i naturen.

BETEENDE OCH HANTERING
Correlophus sarasinorum är nattaktiv och lever gömd. På dagen gömmer den sig, och den blir först på allvar aktiv när ljuset släcks.

NATURLIG UTBREDNING
Nya Kaledonien.