herpy

GECKOR

South-western clawless gecko

Crenadactylus ocellatus

En av Australiens allra minsta geckor: högst 4 cm från nos till kloak och helt utan klor på tårna. *Crenadactylus ocellatus* lever gömd under bark, nedfallet trä och sten i sydvästra Australien. Det finns bara lite kunskap om skötseln, och arten är nästan okänd i terrarier utanför Australien.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Diplodactylus ocellatus; Diplodactylus bilineatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 20 × 20 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**55-75 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Crenadactylus ocellatus*, och arten hålls nästan inte utanför Australien.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 22-26 °C i terrariet, och ett litet område i ena änden får gärna nå 28-30 °C. På natten får temperaturen sjunka till 14-18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara låg till måttlig: 30-50 %. Terrariet ska vara övervägande torrt, men det fuktiga gömslet hålls lätt fuktigt med sphagnum eller jord, så att djuren kan söka fukt och hudömsningen går lätt.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och lever gömd under dagen, så UVB är inte nödvändigt. En svag UVB-lampa för skuggdjur (Ferguson-zon 1) kan monteras över ena hälften av terrariet, men det ska alltid finnas stora skuggade områden och gömslen.
UTFODRING	Kosten i naturen är inte dokumenterad. För storleken passar små leddjur: hoppstjärtar, bananflugor, små termiter, nykläckta syrsor och små kackerlackor. Bytet får inte vara större än avståndet mellan djurets ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	*Crenadactylus ocellatus* är snabb, blyg och svår att se, eftersom den gömmer sig på dagen och är aktiv i mörker.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/geckor/crenadactylus-ocellatus