herpy

GECKOR

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

En nattaktiv gecko från Myanmar, Thailand och Västmalaysia, känd från skogarna vid Pegu. Det finns bara få tillförlitliga skötseluppgifter om arten, så vägledningen bygger på erfarenheter av andra arter i släktet och är en försiktig utgångspunkt.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Gymnodactylus peguensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**90-150 dagar** vid 22-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *Cyrtodactylus peguensis* är inte beskriven, så vägledningen bygger på besläktade arter i släktet och på kraven för nattaktiva, klättrande geckor från fuktiga trakter.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 23-27 °C och på natten 20-23 °C, som hos besläktade arter från fuktig skog. Det finns inget dokumenterat behov av en varm solplats, och arten är inte känd för att sola sig.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Cyrtodactylus peguensis är förmodligen beroende av hög luftfuktighet. Håll den på 60-90 %, högst på natten. Spraya terrariet minst en gång dagligen, och låt ytan torka något emellan, så att det inte uppstår mögel.

LJUS OCH UVB

Cyrtodactylus peguensis är nattaktiv och klarar sig med svag belysning. UVB är inte nödvändigt, men ett svagt UVB-ljus är en fördel.

UTFODRING

Cyrtodactylus peguensis är insektsätare. Ge syrsor, dubia-kackerlackor och liknande insekter som är mindre än avståndet mellan djurets ögon.

BETEENDE OCH HANTERING

Släktet har rykte om sig att vara skyggt, snabbt och ha tunn, känslig hud som lätt spricker. Grips den kan den bita. Hantering avråds därför, och ett djur ska alltid få tid att vänja sig efter en flytt.

NATURLIG UTBREDNING

Myanmar (Burma), Thailand och Malaysia.