herpy

GECKOR

Malayan forest gecko

Cyrtodactylus pulchellus

En vackert tecknad, nattaktiv klippgecko från skogarna på ön Penang i Malaysia. Den har stora, gyllene ögon, kraftiga band över kroppen och tår med klor i stället för häftlameller. Det finns bara få dokumenterade erfarenheter av skötsel och avel, så uppgifterna här är försiktiga.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Gymnodactylus pulchellus; Cyrtodactylus pulchella*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Regnskog och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 23-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre, eftersom arten använder både golv och väggar.
TEMPERATUR	Arten tål värme dåligt. På dagen ska det vara 23-26 °C och på natten 20-22 °C, motsvarande vanlig rumstemperatur. Temperaturen får inte komma över 26 °C under längre tid. En värmelampa är normalt onödig och kan göra skada.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Geckon kommer från en fuktig miljö och ska ha en luftfuktighet på 60-80 %. Fuktigheten bör variera, så att terrariet också kan torka upp lite.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och behöver inte UVB. Ett svagt UVB-ljus är valfritt, så länge djuret helt kan dra sig undan det. Använd i så fall ett rör med låg styrka över en del av terrariet och se till att det finns skugga i resten.
UTFODRING	*Cyrtodactylus pulchellus* är insektsätare. Ge syrsor, gräshoppor, kackerlackor och liknande av en storlek som är mindre än avståndet mellan djurets ögon. Vuxna djur matas 2-3 gånger i veckan och unga varannan dag.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg och tillbakadragen och tillbringar större delen av dagen i ett gömställe. När ljuset släcks kommer den fram och kan röra sig snabbt och smidigt bland stenar och grenar.
NATURLIG UTBREDNING	Malaysia.