herpy

GECKOR

Pacific gecko

Dactylocnemis pacificus

En nervös, snabb och vackert tecknad nattgecko från nordvästra delen av Nya Zeelands Nordön, där den lever i buskmark, skog och på klippkuster. Den föder levande ungar, blir 14-18 cm lång och kan bli över 20 år gammal. Den trivs i ett svalt, tempererat klimat.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Hoplodactylus pacificus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14-18 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-25 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande, klipplevande och marklevande**
Biotop	**Klippterräng och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 100 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och nektar**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**270-360 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *Dactylocnemis pacificus* är bara sparsamt beskriven. Arten räknas som förhållandevis lätt att hålla och föda upp, men det finns inga dokumenterade temperaturer, så klimatvärdena bygger på utbredningsområdet.

TEMPERATUR

Temperaturerna är inte dokumenterade för arten i fångenskap och följer klimatet i utbredningsområdet. På dagen ska det vara 18-24 °C i terrariet och på natten 12-18 °C, så att det svalnar av naturligt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 50-80 %. Spraya terrariet lätt på kvällen, så att blad och bark är fuktiga under natten, och låt det torka upp delvis under dagen. Konstant blöta förhållanden ger mögel och hudproblem.

LJUS OCH UVB

Dactylocnemis pacificus är nattaktiv och solar sig bara dold nära sitt dagsgömsle, så den har inget dokumenterat behov av UVB.

UTFODRING

Dactylocnemis pacificus är allätare, men lever mest av insekter. I naturen tar den malar, flugor, skalbaggar, gräshoppor och andra ryggradslösa djur, och den slickar nektar, saft från små frukter och honungsdagg från sköldlöss.

BETEENDE OCH HANTERING

Dactylocnemis pacificus är snabb, nervös och fäller lätt svansen, så hanteringen hålls på ett minimum. Flytta den bara när det är nödvändigt, och låt den springa från hand till hand över en låg, mjuk yta. Ta aldrig tag i svansen.

NATURLIG UTBREDNING

Nya Zeeland.