herpy

GECKOR

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri är en liten, smal gecko från regnskogens låglänta delar längs Madagaskars östkust, omkring 6-8 cm inklusive svans. Den räknades i många år som en del av *Ebenavia inunguis* och har först sedan 2018 åter varit en egen art. Det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Gekkonidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 24-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ebenavia boettgeri*. Siffrorna i guiden är lånade från *Ebenavia inunguis*, den närmaste och bäst kända släktingen, och de stämmer med klimatet i utbredningsområdet.
TEMPERATUR	På dagen ska terrariet hållas vid 26-28 °C. På natten sjunker temperaturen till omkring 22 °C på sommaren och 18 °C på vintern. Ett lysrör ger normalt tillräckligt med värme.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga kring 70 %. Det är lätt att hålla genom att spraya terrariet en gång om dagen, gärna på kvällen, så att blad och bark blir fuktiga.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och gömmer sig om dagen. Terrariet belyses och värms med ett lysrör, tänt 12 timmar om dagen på sommaren och 10 timmar på vintern, styrt av en timer. UVB är valfritt.
UTFODRING	Ge små insekter och andra små leddjur som är mindre än djurets huvud: bananflugor, hoppstjärtar, nykläckta och små syrsor och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ebenavia boettgeri* är långsam och smygande och inte lämplig att hantera. Djur man försöker ta upp kan fly och släppa svansen, och den växer inte ut igen i samma form.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/geckor/ebenavia-boettgeri