herpy

GECKOR

Western Indian leopard gecko

Eublepharis fuscus

En kraftig, markbunden gecko från västra Indien med mörka fläckband över ryggen, sammetslik hud och rörliga ögonlock. Den är nattaktiv, äter insekter och behöver högre luftfuktighet än sin nära släkting *Eublepharis macularius*. Det finns bara få beskrivna skötselerfarenheter för just den här arten, så mycket av vägledningen bygger på släktingen.

Familj: Eublepharidae Tidigare namn: *Eublepharis macularius fuscus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-25 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Torrskog och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**16-21 °C**
Luftfuktighet	**60-75 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**6-8**
Inkubation	**35-89 dagar** vid 27-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Terrariemåtten är lånade från *Eublepharis macularius*. Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och bottenytan är viktigare än höjden, eftersom arten lever på marken.

TEMPERATUR

På sommaren ska den varmaste platsen under värmekällan vara omkring 35 °C, ett varmt gömställe 32-33 °C och resten av terrariet 22-28 °C, svalast i motsatta änden.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Eublepharis fuscus behöver mycket högre luftfuktighet än *E. macularius*. Luftfuktigheten ska vara 60-75 %, gärna upp till 85 % på natten. På vintern får fuktigheten sjunka något.

LJUS OCH UVB

Arten är aktiv i skymningen och på natten, men ljus på dagen reglerar dygnsrytmen och stimulerar aptiten. Ge omkring 14 timmars ljus på sommaren och skruva gradvis ner till omkring 8 timmar på vintern, helst styrt av en timer.

UTFODRING

Djuret äter bara insekter. Ge syrsor, mjölmaskar och jättemjölmaskar, dubiakackerlackor, silkesmaskar och larver av svart vapenfluga i omväxling. Vaxmott- och smörmasklarver är feta och bara en godbit en gång i veckan.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skygg på dagen och aktiv i skymningen och på natten. Låt nya djur komma till ro i två veckor innan de hanteras, och vänj dem sedan vid handen med korta pass på omkring 5 minuter.

NATURLIG UTBREDNING

Indien.