herpy

GECKOR

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis är den minsta arten i släktet nykaledoniska kameleontgeckor: en liten, nattaktiv trädgecko med gripsvans som bara lever i kustlågland på västsidan av Grande Terre. Arten beskrevs först 2009, är hotad i naturen och syns sällan i fångenskap. Skötseln bygger på släktingarna *Eurydactylodes vieillardi* och *Eurydactylodes agricolae*.

Familj: Diplodactylidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**50-90 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Eurydactylodes occidentalis*. Siffrorna är lånade från *Eurydactylodes vieillardi* och *Eurydactylodes agricolae*, som har nästan samma levnadssätt och storlek.
TEMPERATUR	På dagen ska temperaturen vara 22-26 °C i större delen av terrariet och 27-29 °C på en varm plats under en lampa. På natten ska temperaturen sjunka till 20-23 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll luftfuktigheten på 60-80 %, mätt i mitten av terrariet. Den är lägst i den varma änden och högst i den svala. Den ska stiga på natten och sjunka under dagen, men aldrig understiga 50 %.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och klarar sig utan UVB när fodret innehåller D3-vitamin, men ett svagt UVB-ljus är en fördel.
UTFODRING	Arten är sannolikt frukt- och insektsätare som resten av släktet. Ge ungefär hälften färdigfoder för fruktätande geckor, rört ihop till en tjock gröt, och hälften levande insekter.
BETEENDE OCH HANTERING	*Eurydactylodes occidentalis* är liten och lugn, och släktets arter kan vänjas vid kort hantering. Låt ett nytt djur vara i fred i två veckor och hantera det bara om det har ätit.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Kaledonien.