herpy

GECKOR

Yellow-headed gecko

Gonatodes albogularis

En liten, dagaktiv gecko från Centralamerika, Colombia, Venezuela och de stora karibiska öarna. Hanen har gult till orangegult huvud och mörk kropp, medan honan är brunfläckig. Arten saknar häftlameller, men klättrar och jagar i dagsljus och passar bra i ett tätt planterat, högt terrarium.

Familj: Sphaerodactylidae Tidigare namn: *Gymnodactylus albogularis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-10 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**10-12 mån.**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**60-100 dagar** vid 26-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Arten trivs i ett upprätt terrarium. En enda vuxen gecko kan hållas i omkring 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och ett par ska ha minst 40 × 30 × 45 cm. Större är bättre, eftersom aktiva djur använder hela utrymmet.

TEMPERATUR

Gonatodes albogularis ska ha 24-28 °C på dagen. Ett litet varmare område på 28-30 °C är bra, men arten solar sig nästan inte, och det måste alltid finnas svalare, skuggiga platser att dra sig undan till.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %, och det ska finnas god ventilation. Spraya terrariet en gång om dagen, så att det sitter droppar på blad, kork och rutor som geckorna kan dricka av.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha ljus 11-13 timmar per dygn. Dagsljusrör av typen T5 ger både ljus och lite värme och räcker i sig själva.

UTFODRING

Arten lever av små insekter och andra byten som är mindre än avståndet mellan djurets ögon. Vuxna djur kan få små syrsor, vinglösa bananflugor, små kackerlackor, flugor, mott, ugnsborstsvansar och små mjölmaskar.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skyggare än dagaktiva geckor av släktet *Phelsuma*, men syns ofta, särskilt vid utfodring. Den ska inte hanteras. Den är liten och snabb, och ett enda hopp eller ett fall kan ge en skada eller en flykt.

NATURLIG UTBREDNING

Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Kuba, Haiti, Jamaica och Caymanöarna.