herpy

GECKOR

Common house gecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus är en robust, nattaktiv gecko från Syd- och Sydostasien, som har följt med fartyg och last ut över hela tropikerna och i dag bor i husen i stora delar av världen. Den klättrar på lodräta ytor, jagar insekter under lampor och ropar med ett högt, tickande kluckande. I terrarier är den sällsynt, och den är mest känd som en invasiv art.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-12 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**46-62 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En enskild vuxen *Hemidactylus frenatus* ska ha ett terrarium på minst 40 × 30 × 40 cm (längd × bredd × höjd). Ett par ska ha minst 60 × 40 × 40 cm med många gömslen.

TEMPERATUR

Håll 25-30 °C i terrariet på dagen och 22-25 °C på natten. Gör ett varmt område på 30-32 °C, till exempel med en liten värmelampa i ena änden, och låt den motsatta änden vara sval, så att djuret kan välja.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Håll en luftfuktighet på omkring 50-70 %, och spraya terrariet lätt en gång om dagen, helst på kvällen, så att det finns dagg på blad och stenar. Fuktigheten ska kunna sjunka under dagen.

LJUS OCH UVB

Hemidactylus frenatus är aktiv i skymningen och på natten, och det finns ingen dokumenterad UVB-rekommendation.

UTFODRING

I naturen är *Hemidactylus frenatus* en mångsidig jägare. Insekter och spindlar utgör större delen av kosten: kackerlackor, termiter, flugor, nattfjärilar, skalbaggar, bin och getingar.

BETEENDE OCH HANTERING

Hemidactylus frenatus är snabb, nervös och ska inte hanteras. Den kan bita om den är stressad, men bettet är ganska svagt och ofarligt för människor.

NATURLIG UTBREDNING

Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien och Filippinerna.