herpy

GECKOR

Okavango dwarf gecko

Lygodactylus chobiensis

En av de största dvärggeckorna i släktet, upp till 44 mm från nos till kloak. *Lygodactylus chobiensis* är blågrå med stora ljusa fläckar och gul buk, lever på träd i savannen längs Chobe- och Zambezifloderna och kan hållas i ett litet, högt och tätt terrarium.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Lygodactylus picturatus chobiensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-65 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9 mån.**
Kullstorlek	**2 ägg**
Inkubation	**125 dagar** vid 24-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Lygodactylus chobiensis*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus chobiensis* är ett värmeälskande dagdjur, och terrariet ska ha en tydlig temperaturskillnad.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på omkring 40-65 %, något lägre än för *Lygodactylus picturatus*, eftersom livsmiljön har en lång torrperiod. Siffran är en uppskattning.
LJUS OCH UVB	*Lygodactylus chobiensis* är dagaktiv och behöver kraftigt, jämnt ljus. Använd lysrör, helst T5, och kombinera ett UVB-rör med ett dagsljusrör så att terrariet blir ljust.
UTFODRING	I naturen lever *Lygodactylus chobiensis* mest av myror och termiter. I terrariet ska den få levande smådjur: hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor, nykläckta bönvivlar, små kackerlackor och små gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Lygodactylus chobiensis* är liten och snabb. Liksom andra dagaktiva dvärggeckor sitter den ofta orörlig på en gren och rusar sedan iväg efter ett foderdjur.
NATURLIG UTBREDNING	Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Moçambique och Malawi.