herpy

GECKOR

Wheeler's knob-tailed gecko

Nephrurus wheeleri

Nephrurus wheeleri är en liten, kraftigt byggd markgecko från det torra inlandet i Western Australia med rödbrun kropp, ljusa tvärband och en svans som slutar i en rund knopp. Den är nattaktiv, lever av insekter och behöver ett torrt sandterrarium med ett fuktigt gömställe. En spännande art för den som vill gå vidare från *Eublepharis macularius*.

Familj: Carphodactylidae Tidigare namn: *Nephrurus wheeleri wheeleri*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**15-22 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2 ägg**
Kullar per år	**2-6**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 60 × 45 × 30 cm (längd × bredd × höjd). Höjden betyder inte mycket för en markbunden art, det gör bottenytan.

TEMPERATUR
Arten behöver en tydlig skillnad mellan varm och sval ände. Håll bakgrunden på 22-27 °C på dagen och en varm plats i den ena änden på 30-35 °C. På natten får temperaturen sjunka till 15-22 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Arten kommer från torra trakter och ska hållas torrt med en luftfuktighet på 30-40 %. Spraya en eller två gånger i veckan, inte mer, och se till att ventilationen är så god att ytorna är torra igen efter några timmar.

LJUS OCH UVB
Arten är nattaktiv och behöver inte starkt ljus. Lampor ovanifrån kan stressa djuret, men ett svagt UVB-ljus, högst motsvarande Ferguson-zon 1, kan användas över en del av terrariet när det finns gott om gömställen.

UTFODRING
Arten lever uteslutande av insekter och andra små leddjur. Ge syrsor eller små kackerlackor som baskost och då och då svartsoldatflugelarver, mjölmaskar eller vaxmalslarver som godbit.

BETEENDE OCH HANTERING
Djuret är lugnt och tål korta hanteringar, men det blir sällan lika tamt som *Eublepharis macularius*, och för mycket hantering stressar det. Håll stunderna korta och nära botten, och ta inte upp det på dagen när det sover.

NATURLIG UTBREDNING
Australien.