herpy

GECKOR

Tiger thick-toed gecko

Pachydactylus tigrinus

En liten, kraftigt byggd klippgecko med tvärband i brunt och crème som påminner om en tigers teckning. Den lever i savann och klippterräng i södra Afrika och är nattaktiv. Det finns bara lite kunskap om skötseln, så råden bygger på livsmiljö, klimat och släktingar.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Pachydactylus capensis tigrinus; Pachydactylus capensis rhodesianus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-11 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**55-75 dagar** vid 26-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Pachydactylus tigrinus*.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 24-28 °C, och under en värmelampa eller på en sten under lampan 30-33 °C. På natten ska temperaturen sjunka till 18-22 °C. Det ska alltid finnas en sval ände, så att djuret kan välja.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten lever i torr till halvtorr terräng. Håll luftfuktigheten omkring 30-50 %, och spraya lätt då och då på bakväggen på kvällen, så att djuret kan dricka droppar. Underlaget ska hinna torka igen under dagen.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och håller sig gömd på dagen. UVB är därför inte avgörande när fodret pudras med kalk och D3.
UTFODRING	*Pachydactylus tigrinus* lever av insekter. Syrsor, små dubia-kackerlackor, mjölmask och gräshoppor i lagom storlek är ett bra grundfoder. Bytet ska vara mindre än avståndet mellan djurets ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	Geckon är nervös och snabb och lämpar sig bättre för att betraktas än för att hanteras. Ta aldrig tag i svansen, som kan kastas av. Det sociala livet är inte dokumenterat hos arten.
NATURLIG UTBREDNING	Zimbabwe, Sydafrika, Botswana och Moçambique.